

Cette liste n'a pas vocation à remplacer les RCP et ne doit en aucun cas se substituer au jugement clinique. Au contraire, elle vise à accompagner les équipes et leur apporter des solutions. Elle comporte les données issues des RCP et des documents transmis par les laboratoires. Elle sera mise à jour régulièrement. S'il vous manque des informations, demandez conseil à votre pharmacien.

Méthodologie :

Cette liste a été construite à partir d'une ancienne version, initialement issue de la fusion de plusieurs listes d'établissements de la région Normandie. La mise à jour de 2014 a été faite dans un contexte d'élaboration d'une liste nationale en partenariat avec le groupe gériatrie de la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC).

La plupart des spécialités ont fait l'objet d'une demande d'informations auprès du laboratoire qui les commercialise. Quelques laboratoires de génériques ont également été contactés. Un résumé des informations récupérées est disponible.

Mode de lecture du tableau : consultez les données du tableau liées au RCP, notice patient puis données du laboratoire. En l'absence d'informations, d'autres sources sont citées (Thériaque, HUG). Les données des laboratoires sont tracées. Les pictogrammes suivent les données RCP ou laboratoire (éventuellement une autre source pour les informations différentes de l'écrasabilité).

Il faut tenir compte du fait que **toutes les formes orales ne sont pas écrasables : la pratique du broyage relève de la prescription médicale** (2° de l'article R 5132-3 : « le médecin, après examen du malade, indique lisiblement [...] la dénomination du médicament, [...], la voie d'administration et le mode d'emploi. »). Avant toute prescription, il faut :

- rechercher des alternatives thérapeutiques ou galéniques (formes orodispersibles, etc.) pour limiter la prescription du broyage aux médicaments indispensables ;
- renseigner le motif d'écrasement pour informer de manière éclairée les autres professionnels de santé (difficultés de déglutition, sonde, trouble du comportement, etc.) ;
- prescrire après la ligne dénomination du médicament "à écraser" (si le logiciel le permet).

Il n'est **pas recommandé d'écraser plusieurs principes actifs en même temps.**

Fonctionnement de la liste :

- Cette liste non-exhaustive ne contient que des médicaments sous forme de comprimés (hors lyoc et autres formes dispersibles), granulés, gélules et capsules molles.
- Veuillez noter qu'un médicament à ne pas ouvrir ni écraser ne doit pas non-plus être croqué par le patient lors de la prise.
- La colonne A "Principe actif" contient le nom des molécules, avec son/ses dosage(s) commercialisés et le(s) nom(s) de princeps qui lui sont associé(s).
- La colonne C "Classe ATC" contient un seul code ATC dans un but de classification. Certains médicaments ont cependant plusieurs codes ATC.
- La colonne I "Autre source" contient une information volontairement contradictoire avec les modalités de préparations (colonne G), retenue pour sa pertinence.
- Les imageries d'aliments et de boissons de la colonne J sont non exhaustives, et présentées à titre d'exemple uniquement.
- La colonne K "Alternatives galéniques" ne contient que les médicaments par voie systémique (voie orale, suppositoires...) excepté les formes injectables.

Le contenu d'une colonne peut être filtré au moyen des coches présentes en ligne 1. Pour toute information précise, utilisez la fonction Rechercher du logiciel.

Lexique :

RCP : résumé des caractéristiques du produit

Classe ATC : classe anatomique, thérapeutique et chimique

GR : gastro-résistant

LM : libération modifiée

LP : libération prolongée

AAC : autorisation d'accès compassionnel

AAP : autorisation d'accès précoce

PA : principe actif

HUG : Hôpitaux de Genève

Légende :

	<u>G</u> : goût désagréable		<u>E</u> : écrasement possible		<u>NE</u> : ne pas écraser ni croquer		<u>O</u> : ouverture possible		<u>NO</u> : ne pas ouvrir		<u>D</u> : délitement possible (colonne G)
	<u>E</u> : prise possible avec de l'eau (colonne J)		<u>J</u> : prise possible avec un jus d'orange		<u>L</u> : prise possible avec du lait		<u>C</u> : prise possible avec une compote		<u>Y</u> : prise possible avec un yaourt		<u>V</u> : prise immédiate après préparation

Vous pouvez contribuer à la mise à jour de ce tableau :

Si vous disposez de réponses laboratoires plus récentes ou si vous détectez un produit manquant, envoyez nous un e-mail à l'adresse ci-dessous :

ars-normandie-omedit@ars.sante.fr

Notez qu'il est nécessaire de disposer d'une **réponse écrite du laboratoire** afin de compléter le tableau. Nous pourrions ainsi l'actualiser grâce à vos contributions.

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
ABACAVIR / DOLUTÉGRAVIR / LAMIVUDINE 600/50/300 mg (Triumeq)	Comprimé	J05AR13	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		buvables, Dolutégravir comprimés dispersibles	La biodisponibilité des comprimés dispersibles de Dolutégravir est 1,6 fois supérieure à celle des comprimés pelliculés.		4/18/2023
ABACAVIR / LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE 300/150/300 mg (Trizivir)	Comprimé	J05AR04	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solutions buvables	A prendre de préférence au coucher.	GSK 20-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ABACAVIR / LAMIVUDINE 600/300 mg (Kivexa)	Comprimé	J05AR02	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			Notice patient			Solutions buvables		GSK 20-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ABACAVIR 300 mg (Ziagen)	Comprimé	J05AF06	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable	Mélangable à une petite quantité de nourriture ou de liquide. Administration immédiate.		4/18/2023
ABEMACICLIB 50, 100 et 150mg (Verzenios)	Comprimé	L01EF03	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP	Dispersible selon le laboratoire		Non	A prendre à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse.	LILLY 15-05-2024 : peut être dispersé (sans l'écraser) dans 10mL d'eau, boire l'entière du verre dans les 10min, rincer et boire l'eau de rinçage tant qu'il reste des résidus sur la paroi.	5/16/2024
ACAMPROSATE 333 mg (Aotal)	Comprimé GR	N07BB03	Médicaments des troubles de l'addiction	Médicaments utilisés en cas de dépendance à l'alcool			Notice patient			Non	A prendre de préférence en dehors des repas si bonne tolérance digestive.		4/18/2023
ACARBOSE 50 et 100 mg (Glucor)	Comprimé ou comprimé sécable	A10BF01	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Inhibiteurs de l' α -glucosidase			RCP			Non	Doit être avalé avec un peu d'eau ou croqué. A prendre au début des repas.		4/18/2023
ACEBUTOLOL 200 et 400 mg (Sectral)	Comprimé	C07AB04	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants sélectifs			Notice patient			Solution buvable			4/18/2023
ACEBUTOLOL LP 500 mg (Sectral LP)	Comprimé LP	C07AB04	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants sélectifs			RCP			Δ Non LP Δ Solution buvable			4/18/2023
ACENOCOUMAROL 1 et 4 mg (Mini-sintrom, Sintrom)	Comprimé sécable	B01AA07	Antithrombotiques	Antivitamines K			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe, de préférence le soir.		4/18/2023
ACETAZOLAMIDE 250 mg (Diamox)	Comprimé sécable	S01EC01	Antiglaucomeux et myotiques	Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence pendant les repas pour masquer l'amertume.	Cooper 22-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ACETYLLEUCINE 500 mg (Tanganil)	Comprimé	N07CA04	Antivertigineux	Antivertigineux			Réponse laboratoire			Non		Pierre Fabre 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
ACICLOVIR 200 et 800 mg (Zovirax)	Comprimé	J05AB01	Antiviraux à action directe	Nucléosides et nucléotides sauf inhibiteurs de la transcriptase inverse			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable			4/18/2023
ACIDE ALENDRONIQUE / CHOLECALCIFEROL 70/2800 et 70/5600 UI (Fosavance)	Comprimé	M05B03	Médicaments affectant la structure et la minéralisation osseuse	Biphosphonates en associations			RCP			Acide alendronique comprimé effervescent + Cholecalciferol buvable	PA très irritant (risque d'ulcération). A prendre avec un grand verre d'eau (\geq 200 mL) peu minéralisée le matin à jeun. Patienter ensuite \geq 30 min avant de manger, boire, s'allonger ou prendre d'autres médicaments.		4/18/2023
ACIDE ALENDRONIQUE 10 et 70 mg (Fosamax)	Comprimé	M05BA04	Médicaments affectant la structure et la minéralisation osseuse	Biphosphonates			RCP			Comprimés effervescents	PA très irritant (risque d'ulcération). A prendre avec un grand verre d'eau (\geq 200 mL) peu minéralisée le matin à jeun. Patienter ensuite \geq 30 min avant de manger, boire, s'allonger ou prendre d'autres médicaments.		4/18/2023
ACIDE CLODRONIQUE 520 et 800 mg (Clastoban, Lytos)	Comprimé	M05BA02	Médicaments affectant la structure et la minéralisation osseuse	Biphosphonates			RCP			Non	PA très irritant. A prendre avec un grand verre d'eau (\geq 200 mL) peu minéralisée le matin à jeun (et \geq 2h après un repas si 2ème prise journalière). Ne pas manger, boire ni trop bouger jusqu'à 1h après la prise.		4/18/2023
ACIDE FOLINIQUE 5 et 25 mg (Folinoral)	Géule	V03AF03	Tous autres médicaments	Médicaments détoxifiants dans un traitement cytotatique			Réponse laboratoire			Non		Therabel 25-02-2022 : possibilité d'ouvrir la géule et de mélanger le contenu avec de la nourriture ou une boisson.	4/18/2023
ACIDE FOLINIQUE 5, 15 et 25 mg (Ledefoline)	Comprimé sécable	V03AF03	Tous autres médicaments	Médicaments détoxifiants dans un traitement cytotatique			Réponse laboratoire			Non		Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
ACIDE FOLIQUE 0,4 et 5 mg (Specifoline)	Comprimé	B03BB01	Vitamine B12 et acide folique	Acide folique et dérivés			Réponse laboratoire			Non		Sanoofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ACIDE FUSIDIQUE 250 mg (Fucidine)	Comprimé	J01XC01	Autres antibactériens	Antibactériens stéroïdiens			Réponse laboratoire			Suspension buvable		Leo pharma 14-02-2022 : écrasement possible si administration immédiate mais goût amer. Peut être pris avec un liquide sucré. Ne pas prendre avec du lait.	4/18/2023
ACIDE MEFENAMIQUE 250 mg (Ponstyl)	Géule	M01AG01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Fénamates			RCP			Non	A prendre pendant les repas.	Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
ACIDE NIFLUMIQUE 250 mg (Nifluril)	Géule	M01AX02	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Autres anti-inflammatoires antirhumatismaux non stéroïdiens			RCP			Suppositoires	A prendre pendant les repas.		4/18/2023
ACIDE PARA-AMINOSALICYLIQUE 4 g (Granupas)	Granulés GR	J04AA01	Antituberculeux	Acide aminosalicylique et dérivés			RCP			Non	Peut être mélangé à un jus d'orange ou de tomate, de la compote ou un yaourt, tant que les granulés restent intacts.		4/18/2023
ACIDE RISEDRONIQUE 5, 30, 35 et 75 mg (Actonel)	Comprimé	M05BA07	Médicaments affectant la structure et la minéralisation osseuse	Biphosphonates			RCP			Non	PA très irritant (risque d'ulcération). A prendre avec un grand verre d'eau (\geq 200 mL) peu minéralisée le matin à jeun. Patienter ensuite \geq 30 min avant de manger, boire, s'allonger ou prendre d'autres médicaments.	Theramex 17-02-2022 : cf RCP	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
ACIDE TIAPROFENIQUE 100 et 200 mg (Surgam)	Comprimé sécable	M01AE11	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			Non	Peut être dissout sans l'écraser dans un grand verre d'eau.		4/18/2023
ACIDE TRANEXAMIQUE 500 mg (Exacyl)	Comprimé	B02AA02	Antifibrinolytiques	Acides aminés			Réponse laboratoire			Solution buvable		Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
ACIDE URISODESOXYCHOLIQUE 200 mg (Ursolvan)	Gélu	A05AA02	Traitement de la vésicule biliaire	Acides biliaires et dérivés			Notice patient			Suspension buvable (AAC)	A prendre pendant les repas.	Cheplapharm 14-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
ACIDE URISODESOXYCHOLIQUE 250 et 500 mg (Cholurso, Delursan)	Comprimé ou comprimé sécable	A05AA02	Traitement de la vésicule biliaire	Acides biliaires et dérivés			Réponse laboratoire			Suspension buvable (AAC)	A prendre pendant les repas.	Laboratoires Mavoly Spindler 27-06-25 : écrasement possible mais goût amer.	6/27/2025
ACITRETINE 10 et 25 mg (Soriatane)	Gélu	D05B02	Médicaments contre le psoriasis à usage systémique	Rétinoïdes pour le traitement du psoriasis			Notice patient	Ouvrable selon laboratoire		Non	PA tératogène. A prendre de préférence pendant les repas ou avec du lait	Arrow 15-03-2022 : ouverture possible si administration immédiate (molécule très fragile) et lavage des mains au savon (contact cutané seul non tératogène, mais à risque d'ingestion).	4/18/2023
ADEFOVIR 10 mg (Hepsera)	Comprimé	J05AF08	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique			Réponse laboratoire			Non		Gilead 02-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
AFATINIB 20, 30, 40 et 50 mg (Giotrif)	Comprimé	L01EB03	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP			Non	A prendre à heure fixe, ≥ 1h avant ou ≥ 3h après les repas. Peut être dispersé sans l'écraser dans environ 100 mL d'eau plate (aucun autre liquide ne doit être utilisé) et administré <15 min après dispersion.	Boehringer 24-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
AGOMELATINE 25 mg (Valdoxan)	Comprimé	N06AX22	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre au coucher.	Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ALBENDAZOLE 400 mg (Eskazole, Zentel)	Comprimé	P02CA03	Antinématodes	Dérivés du benzimidazole			RCP			Suspension buvable	Peut être croqué.		4/18/2023
ALFALCALCIDOL 0,25 0,5 et 1 µg (Un-alfa)	Capsule molle	A11CC03	Vitamines A et D, y compris en association	Vitamine D et analogues			RCP			Solution buvable		Cheplapharm 14-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
ALFUZOSINE 2,5 mg (Xatral)	Comprimé	G04CA01	Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate	Alpha-bloquants			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ALFUZOSINE LP 10 mg (Xatral LP)	Comprimé LP	G04CA01	Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate	Alpha-bloquants			RCP			Non	A prendre le soir après les repas.		4/18/2023
ALIMEMAZINE 5 mg (Theralene)	Comprimé sécable	R06AD01	Antihistaminiques à usage systémique	Dérivés de la phénothiazine			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes		Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données	4/18/2023
ALLOPURINOL 100, 200 et 300 mg (Zyloric)	Comprimé	M04AA01	Médicaments contre la goutte	Inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre après les repas pour améliorer la tolérance.	HAC Pharma 22-02-2022 : peut être dispersé dans 10 mL d'eau si besoin	4/18/2023
ALPRAZOLAM 0,25 ; 0,5 et 1 mg (Xanax)	Comprimé sécable	N05BA12	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Non		Pfizer 04-08-2020 : écrasement déconseillé car hors-AMM. Des études de bioeq et de stabilité sont favorables au broyage et à la mise en suspension.	4/18/2023
ALTIZIDE / SPIRONOLACTONE 25/15 mg (Aldactazine)	Comprimé sécable	C03EA04	Diurétiques et épargneurs potassiques en association	Diurétiques low-ceiling et épargneurs potassiques			Réponse laboratoire			Non	A éviter de préférence en fin de journée.	Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
ALTRETAMINE 100 mg (Hexastat)	Gélu	L01XX03	Autres antinéoplasiques	Autres antinéoplasiques			Notice patient			Non	PA cytotoxique. A prendre après les repas et avant le coucher.	Laboratoires Delben 14-03-2022 : Poudre irritante, ne pas ouvrir pour éviter tout contact.	4/18/2023
ALVERINE / SIMETICONE 60/300mg (Meteospasmyl)	Capsule molle	A03AX58	Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux	Autres médicaments en cas de troubles fonctionnels du côlon			Réponse laboratoire			Non	A prendre au début des repas ou au moment des douleurs.	Laboratoires Mavoly Spindler 26-04-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	9/19/2023
AMANTADINE 100 mg (Mantadix)	Capsule molle	N04BB01	Dopaminergiques	Dérivés de l'adamantane			Galénique			Sirop (AAC)			4/18/2023
AMBENONIUM 10 mg (Mytelase)	Comprimé sécable	N07AA30	Parasympathomimétiques	Anticholinestérasiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence pendant ou en fin de repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
AMBROXOL 30 mg (génériques)	Comprimé sécable	R05CB06	Expectorants sauf associations avec des antitussifs	Mucolytiques			Réponse laboratoire			Solution buvable		Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais les études s'accordent sur un écrasement possible.	9/19/2023
AMILORIDE / HYDROCHLOROTHIAZIDE 5/50mg (génériques)	Comprimé	C03EA01	Diurétiques et épargneurs potassiques en association	Diurétiques low-ceiling et épargneurs potassiques			Réponse laboratoire			Non		Teva 01-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
AMIODARONE 200 mg (Cordarone)	Comprimé sécable	C01BD01	Antiarythmiques de classe I et III	Antiarythmiques, classe III			Notice patient			Non	Eviter le jus de pamplemousse.	Sanofi 23-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
AMISULPRIDE 100, 200 et 400 mg (Solian)	Comprimé sécable	N05AL05	Antipsychotiques	Benzamides			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
AMITRIPTYLINE 25 et 50 mg (Elavil, Laroxy)	Comprimé	N06AA09	Antidépresseurs	Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines			Notice patient			Solution buvable		Teofarma 08-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Sensible à l'humidité et goût amer.	4/18/2023
AMLODIPINE / INDAAPAMIDE 1,5/5 et 1,5/10 mg (Natrixam LM)	Comprimé LM	C08GA02	Inhibiteurs calciques et diurétiques	Inhibiteurs calciques et diurétiques			RCP			Non	A prendre de préférence le matin. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
AMLODIPINE / PERINDOPRIL 5/5, 5/10, 10/5 et 10/10 mg (Coveram)	Comprimé	C09B04	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et inhibiteurs des canaux calciques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence le matin à jeun. Eviter le jus de pamplemousse.	Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
AMLODIPINE / VALSARTAN 5/80, 5/160 et 10/160 mg (Exforge)	Comprimé	C09DB01	Antagonistes de l'angiotensine II en associations	Antagoniste de l'angiotensine II et inhibiteurs des canaux calciques			Thériaque 03/2023	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
AMLODIPINE 5 et 10 mg (Amlor)	Gélule	C08CA01	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse.	Pfizer 04-08-2020 : des études de bioeq et de stabilité sont favorables à la dispersion dans un liquide sucré ou une compote si administration immédiate. Peu hydrosoluble.	4/18/2023
AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE 500/62,5 mg (Augmentin)	Comprimé	J01CR02	Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines	Pénicillines associées à un inhibiteur de bêta-lactamases			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Poudre pour suspension buvable	A prendre de préférence au début des repas.	GSK 02-10-2020 : cf. RCP	4/18/2023
AMOXICILLINE 500 mg (Clamoxyl)	Gélule	J01CA04	Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines	Pénicillines à large spectre			RCP			Poudre pour suspension buvable, comprimés de 1 g dispersibles		GSK 02-10-2020 : cf. RCP	4/18/2023
ANASTROZOLE 1 mg (Arimidex)	Comprimé	L02BG03	Anthormones et apparentés	Inhibiteurs de l'aromatase			Notice patient			Non	A prendre de préférence à heure fixe (uniquement pour favoriser l'observance).	Juvisse Pharmaceuticals 31-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude, mais le comprimé est petit et généralement avalé sans difficulté. Peu hydrosoluble.	4/18/2023
ANETHOLTRITHIONE 12,5 et 25 mg (Sulfarlem)	Comprimé	A16AX02	Autres produits pour les voies digestives et le métabolisme	Produits divers pour le tube digestif et le métabolisme			Thériaque 03/2023			Non	A prendre pendant les repas.		4/18/2023
APIXABAN 2,5 et 5 mg (Eliquis)	Comprimé	B01AF02	Antithrombotiques	Inhibiteurs directs du facteur Xa			RCP			Non	Les comprimés écrasés sont stables dans l'eau, le glucose à 5%, le jus ou la compote de pomme pendant au moins 4 heures. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
APREPITANT 80 et 125 mg (Emend)	Gélule	A04AD12	Antiémétiques et antinauséux	Autres antiémétiques			RCP			Poudre pour suspension buvable			4/18/2023
ARIPIRAZOLE 5, 10 et 15 mg (Ablify)	Comprimé	N05AX12	Antipsychotiques	Autres antipsychotiques			Thériaque 03/2023	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés orodispersibles, solution buvable	A prendre de préférence à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
ARTEMETHER / LUMEFANTRINE 20/120 mg (Riamet)	Comprimé	P01BF01	Antipaludéens	Artémisinine et dérivés en association			RCP			Non	A prendre au cours des repas ou avec une boisson lactée pour améliorer l'absorption. Eviter le jus de pamplemousse.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
ARTENIMOL / PIPERAQUINE 40/320 mg (Eurartesim)	Comprimé	P01BF05	Antipaludéens	Artémisinine et dérivés en association			RCP			Non	Les comprimés écrasés peuvent être mélangés à de l'eau. A prendre ≥ 3h après le dernier repas et ne pas manger pendant ≤ 3h après la prise.		4/18/2023
ATAZANAVIR 150, 200 et 300 mg (Reyataz)	Gélule	J05AE08	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de protéase			RCP	Ouvrable selon HUG 03/2023		Non	Eviter le jus de pamplemousse.	Bristol Myers Squibb 28-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
ATENOLOL / CHLORTALIDONE 50/12,5 mg (Tenoretic)	Comprimé sécable	C07CB03	Bêta-bloquants et thiazidiques	Bêta-bloquants sélectifs et autres diurétiques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe.	AstraZeneca 06-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
ATENOLOL / NIFEDIPINE 50/20 mg (génériques)	Gélule LP	C07FB03	Bêta-bloquants, autres associations	Bêta-bloquants et inhibiteurs du canal de calcium		?				Non	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe.	En attente (Biogaran)	4/18/2023
ATENOLOL 50 et 100 mg (Tenormine)	Comprimé sécable	C07AB03	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants sélectifs			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe.	AstraZeneca 02-10-2020 : pas d'étude mais possible en cas de besoin si administration immédiate. Hydrosoluble et amer.	4/18/2023
ATORVASTATINE 10, 20, 40, 80 mg (Tahor)	Comprimé	C10AA05	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)			Notice patient			Comprimés à croquer	A prendre de préférence à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse.	Pfizer 04-08-2020 : écrasement déconseillé mais une étude est favorable à la mise en suspension, bien qu'elle soit moins bien tolérée. Peu hydrosoluble et photosensible.	4/18/2023
ATOVAQUONE / PROGUANIL 62,5/25 et 250/100 mg (Malarone)	Comprimé	P01BB51	Antipaludéens	Biguanides			RCP			Non	A administrer à heure fixe pendant les repas ou avec une boisson lactée pour améliorer l'absorption.		4/18/2023
AZATHIOPRINE 25 et 50 mg (Imurel)	Comprimé ou comprimé sécable	L04AX01	Immunosuppresseurs	Autres immunosuppresseurs			RCP			Non	PA cytotoxique. Mieux toléré si pris pendant les repas, sans prendre de lait ni produits laitiers (≥ 1h avant ou ≥ 2h après). Ne pas diviser le comprimé en deux sauf cas particuliers (cf RCP).	ASPEN Pharma 22-02-2022 : non-écrasable car cytotoxique. Peut être dispersé dans 10 mL d'eau en 5 min pour administration par SNG.	4/18/2023
AZITHROMYCINE 250 et 600 mg (Zithromax)	Comprimé	J01FA10	Macrolides, lincosamides et streptogramines	Macrolides			Réponse laboratoire			Comprimés dispersibles, poudre pour suspension buvable		Pfizer 04-08-2020 : pas d'étude mais pas d'opposition à l'écrasement si administration immédiate. Le pelliculage masque le goût amer. Photosensible.	9/19/2023
BACLOFENE 10 mg (Lioresal)	Comprimé sécable	M03BX01	Myorelaxants à action centrale	Autres myorelaxants à action centrale			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable (AAC)	A prendre pendant les repas.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
BAMBUTEROL 10 mg (Oxeol)	Comprimé sécable	R03CC12	Adrénérergiques à usage systémique	Agonistes sélectifs des récepteurs β2 adrénérergiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre avant le coucher.	AstraZeneca 06-10-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Il s'agit d'un comprimé sans pelliculage, enrobage, dragéification ou tout autre procédé galénique particulier.	6/27/2025

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
BENAZEPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 10/12,5 mg (Cibadrex)	Comprimé sécable	C09BA07	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques			Réponse laboratoire			Non		Viatis 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
BENAZEPRIL 5 et 10 mg (génériques)	Comprimé ou comprimé sécable	C09AA07	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association			Réponse laboratoire			Non		Arrow 21-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
BENZYLTHIOURACILE 25 mg (Basdene)	Comprimé	H03BA03	Antithyroïdiens	Thiouraciles			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence pendant les repas.	Bouchara-Recordati 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
BETA-CAROTENE / MYRTILLE EXTRAIT ANTHOCYANOSIDIQUE 5/100 mg (Difarel)	Comprimé	C05CX	Médicaments agissant sur les capillaires	Autres stabilisateurs de capillaires			RCP	Ecrasable selon laboratoire		Non		Biocodex 25-02-2022 : peut être écrasé si besoin, mais mauvais goût.	4/18/2023
BETAHISTINE 8, 16 et 24 mg (Serc, Betaserc, Lectil)	Comprimé ou comprimé sécable	N07CA01	Antivertigineux	Antivertigineux			Notice patient			Non	A prendre pendant les repas pour améliorer la tolérance.	Viatis 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
BETAXOLOL 20 mg (Kerlone)	Comprimé sécable	C07AB05	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants sélectifs			Notice patient			Non		Cheplapharm 14-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
BEZAFIBRATE 200 mg (Befizal)	Comprimé	C10AB02	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Fibrates			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence pendant les repas.	Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais des études suggèrent sur un écrasement possible. Goût amer.	4/18/2023
BEZAFIBRATE LP 400 mg (Befizal LP)	Comprimé LP	C10AB02	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Fibrates			Galénique			Non	A prendre de préférence pendant les repas.		4/18/2023
BICALUTAMIDE 50 mg (Casodex)	Comprimé	L02BB03	Antihormones et apparentés	Anti-androgènes			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence à heure fixe (uniquement pour favoriser l'observance).	Juvisse Pharmaceuticals 31-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Très peu hydrosoluble.	4/18/2023
BICTEGRAVIR / EMTRICITABINE / TENOFOVIR 30/120/15 mg (Biktarvy)	Comprimé	J05AR20	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			RCP			Non	A prendre avec ou sans nourriture. Eviter le jus de pamplemousse.	Gilead 3-04-2025 : le fait d'écraser les comprimés de Biktarvy® 30 mg/120 mg/15 mg et de les disperser dans un milieu liquide n'a pas été étudié et n'est pas recommandé.	4/3/2025
BICTEGRAVIR / EMTRICITABINE / TENOFOVIR 50/200/25 mg (Biktarvy)	Comprimé	J05AR20	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			RCP			Non	A prendre avec ou sans nourriture. Eviter le jus de pamplemousse.	Gilead 25-05-2025 : Seul le dosage Biktarvy® 50 mg/200 mg/25 mg (qui n'est pas exclusivement adulte) a fait l'objet d'une étude de son administration en écrasant les comprimés ou en les dispersant dans un milieu liquide par rapport à un comprimé entier.	4/1/2025
BIPERIDENE LP 4 mg (Akineton LP)	Comprimé LP	N04AA02	Anticholinergiques	Amines tertiaires			Réponse laboratoire			Non	A prendre le matin.	DB Pharma 21-02-2022 : pas d'informations complémentaires au RCP	4/18/2023
BISACODYL 5 mg (Contalax, Dulcolax)	Comprimé GR	A06AB02	Laxatifs	Laxatifs de contact			RCP			Suppositoires	PA irritant.		4/18/2023
BISOPROLOL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 2,5/6,25 ; 5/6,25 et 10/6,25 mg (Lodoz)	Comprimé	C07BB07	Béta-bloquants et thiazidiques	Béta-bloquants sélectifs et autres diurétiques			RCP			Non	A prendre le matin.		4/18/2023
BISOPROLOL 1,25 ; 2,5 ; 3,75 ; 5 ; 7,5 et 10 mg (Cardensiel, Detensiel)	Comprimé ou comprimé sécable	C07AB07	Béta-bloquants	Béta-bloquants sélectifs			RCP			Non	A prendre le matin.		4/18/2023
BOSENTAN 62,5 et 125 mg (Tracleer)	Comprimé	C02KX01	Autres antihypertenseurs	Antihypertenseurs pour l'hypertension artérielle pulmonaire			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés dispersibles		Janssen 09-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	9/19/2023
BROMAZEPAM 1,5 et 6 mg (Lexomil)	Comprimé ou comprimé sécable	N05BA08	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Non		Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
BROMOCRIPTINE 2,5 mg (Parlodel)	Comprimé sécable	N04BC01	Dopaminergiques	Agonistes dopaminergiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas pour améliorer la tolérance digestive. Eviter le jus de pamplemousse.	Viatis 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
BROMOCRIPTINE 5 et 10 mg (Parlodel)	Gélule	N04BC01	Dopaminergiques	Agonistes dopaminergiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas pour améliorer la tolérance digestive. Eviter le jus de pamplemousse.	Viatis 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
BUDESONIDE 3 et 9 mg (Entocort, Mikicort)	Gélule GR	A07EA06	Anti-inflammatoires intestinaux	Corticostéroïdes locaux			RCP			Non	A prendre en une seule prise le matin		9/19/2023
BUMETANIDE 1 et 5 mg (Burinex)	Comprimé sécable	C03CA02	Diurétiques de l'anse	Sulfamides non associés			Réponse laboratoire			Non		Alloga 21-04-2022 : écrasement possible si administration immédiate. Photosensible, peu soluble et légèrement amer.	4/18/2023
BUSULFAN 2 mg (Myleran)	Comprimé	L01AB01	Alkylants	Sulfonates d'alkyle			Réponse laboratoire			Non	PA cytotoxique. Manipuler les comprimés avec précaution et éviter autant que possible un contact prolongé avec la main.	ASPEN Pharma 22-02-2022 : des protocoles existent pour réaliser un sirop à partir des comprimés, en suivant les précautions d'usage de manipulation des produits cytotoxiques.	4/18/2023
CAFEINE / ERGOTAMINE 100/1 mg (Gynergene caféine)	Comprimé	N02CA52	Antimigraineux	Alcaloïdes de l'ergot de seigle		?				Non	Eviter le jus de pamplemousse.	En attente (Centre de Spécialités Pharmaceutiques)	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
CALCITRIOL 0,25 µg (Rocaltrol)	Capsule molle	A11CC04	Vitamines A et D, y compris en association	Vitamine D et analogues			RCP			Non			4/18/2023
CALCIUM / CHOLECALCIFEROL 600 mg / 400 UI (Caltrate vitamine D3)	Comprimé	A12AX	Calcium	Calcium en association avec vitamine D étou d'autres médicaments			Réponse laboratoire			Comprimés effervescents, dispersibles, à sucer ou à croquer, poudre orale	A prendre à distance des repas	GSK 15-02-2022 : écrasement possible si besoin	4/18/2023
CALCIUM CARBONATE 600 mg (Caltrate)	Comprimé	A12AA04	Calcium	Calcium			Réponse laboratoire			Comprimés effervescents, dispersibles, à sucer ou à croquer, poudre orale	A prendre à distance des repas	GSK 15-02-2022 : écrasement possible si besoin	4/18/2023
CANDESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 8/12,5 et 16/12,5 mg (Hyacand)	Comprimé	C09DA06	Antagonistes de l'angiotensine II en associations	Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence à heure fixe.	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CANDESARTAN 4, 8, 16 et 32 mg (Atacand)	Comprimé sécable	C09CA06	Antagonistes de l'angiotensine II non associés	Antagonistes de l'angiotensine II non associés			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CAPECITABINE 150 et 500 mg (Xeloda)	Comprimé	L01BC06	Antimétabolites	Analogues de la pyrimidine			RCP			Non	PA cytotoxique. A prendre 30 min après les repas.	Roche 21-02-2022 : écrasement déconseillé, risque d'effets indésirables (cf RCP)	4/18/2023
CAPTOPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 50/25 mg (génériques)	Comprimé sécable	C09BA01	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe.	Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CAPTROPIL 25 et 50 mg (génériques)	Comprimé sécable	C09AA01	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association			Réponse laboratoire			Solution buvable	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe.	Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais les études rapportent un écrasement possible.	4/18/2023
CARBAMAZEPINE 200 mg (Tegreto)	Comprimé sécable	N03AF01	Antiépileptiques	Dérivés du carboxamide			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable	Eviter le jus de pamplemousse.	Novartis 16-03-2022 : cf RCP	4/18/2023
CARBAMAZEPINE LP 200 et 400 mg (Tegreto LP)	Comprimé sécable LP	N03AF01	Antiépileptiques	Dérivés du carboxamide			RCP			△ Non LP △ Suspension buvable	Eviter le jus de pamplemousse.	Novartis 16-03-2022 : cf RCP	4/18/2023
CARBIMAZOLE 5 et 20 mg (Neomercazole)	Comprimé	H03BB01	Antithyroïdiens	Dérivés imidazolés soufrés			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		En attente (Centre de Specialites Pharmaceutiques)	4/18/2023
CARVEDILOL 6,25 ; 12,5 et 25 mg (Kredex)	Comprimé sécable	C07AG02	Bêta-bloquants	Alpha et bêta-bloquants			Réponse laboratoire			Non	A prendre à heure fixe, au moment des repas pour améliorer la tolérance.	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CEFALEXINE 500 et 1000 mg (Keforal)	Comprimé	J01DA01	Autres antibactériens bêta-lactamines	Céphalosporines de première génération			Réponse laboratoire			Suspension buvable	A prendre de préférence en dehors des repas. Ne pas prendre avec du lait.	Sciencex 07-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût désagréable.	4/18/2023
CEFIXIME 200 mg (Oroken)	Comprimé	J01DD08	Autres antibactériens bêta-lactamines	Céphalosporines de troisième génération			Réponse laboratoire			Poudre pour suspension buvable		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
CEFPODOXIME 100 mg (Orelax)	Comprimé	J01DD13	Autres antibactériens bêta-lactamines	Céphalosporines de troisième génération			Réponse laboratoire			Poudre pour solution buvable	A prendre pendant les repas	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
CEFUROXIME 125, 250 et 500 mg (Zinnat)	Comprimé	J01DC02	Autres antibactériens bêta-lactamines	Céphalosporines de deuxième génération			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Granulés pour suspension buvable	A prendre après les repas pour améliorer l'absorption.		4/18/2023
CELECOXIB 100 et 200 mg (Celebrex)	Gélule	M01AH01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Coxibs			RCP			Non	A prendre de préférence à heure fixe. Peut être vidé sur de la nourriture semi-solide (compote, yaourt, purée) et avalé immédiatement avec un verre d'eau.		4/18/2023
CELIPROLOL 200 mg (Celectol)	Comprimé	C07AB08	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants sélectifs			Notice patient			Non	A prendre de préférence de matin, ≥ 30 min avant ou ≥ 2h après les repas.	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CETIRIZINE 10 mg (Zyrtecset)	Comprimé sécable	R06AE07	Antihistaminiques à usage systémique	Dérivés de la pipérazine			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes, comprimés à sucer		UCB Pharma 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CHLORAMBUCIL 2 mg (Chloraminophène)	Gélule	L01AA02	Alkylants	Analogues des moutardes azotées			Notice patient			Non	A prendre à jeun. PA cytotoxique.	Laboratoires Techni-pharma 08-03-2022 : gélule non ouvrable	4/18/2023
CHLOROQUINE 100 mg (Nivaquine)	Comprimé sécable	P01BA01	Antipaludéens	Aminoquinoléines			RCP			Non	A prendre en fin de repas, de préférence le matin ou le midi. Mélangéable à un yaourt ou un liquide sucré.	Sanofi 23-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
CHLORPROMAZINE 25 et 100 mg (Largactil)	Comprimé sécable	N05AA01	Antipsychotiques	Phénothiazines à chaîne latérale aliphatique			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
CHONDROITINE 400 mg (Chondrosulf)	Gélule	M01AX25	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Autres anti-inflammatoires antirhumatismaux non stéroïdiens			RCP			Gel oral	A prendre de préférence pendant les repas.		4/18/2023
CIBENZOLINE 130 mg (Exacor)	Comprimé sécable	C01BG07	Antiarythmiques de classe I et III	Autres antiarythmiques de classe I et III			Réponse laboratoire			Non		Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
CICLOSPORINE 10, 25, 50 et 100 mg (Neoral)	Capsule molle	L04AD01	Immunosuppresseurs	Inhibiteurs de la calcineurine			RCP			Solution buvable	A prendre à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
CINACALCET 30, 60 et 90 mg (Mimpara)	Comprimé	H05BX01	Antiparathyroïdiens	Autres antiparathyroïdiens			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Granulés en gélule ouvrable	A prendre pendant ou en fin de repas.		4/18/2023
CIPROFIBRATE 100 mg (Lipanon)	Gélule	C10AB08	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Fibrates			Réponse laboratoire			Non		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
CIPROFLOXACINE 250, 500 et 750 mg (Ciflox)	Comprimé sécable	J01MA02	Quinolones antibactériennes	Fluoroquinolones			RCP			Granulés pour suspension buvable	Ne pas prendre avec des produits laitiers ou boissons enrichies en calcium.	Bayer 03-08-2020 : broyage déconseillé car goût amer. Peut être utilisé en SNG.	4/18/2023
CITALOPRAM 20 mg (Seropram)	Comprimé sécable	N06AB04	Antidépresseurs	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable	Goût amer et photosensibilité.	Lundbeck 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CLARITHROMYCINE 250 et 500 mg (Zeclar)	Comprimé	J01FA09	Macrolides, lincosamides et streptogramines	Macrolides			Réponse laboratoire			Granulés pour suspension buvable		Viatris 17-02-2023 : nous recommandons d'utiliser le comprimé dans sa forme galénique initiale.	4/18/2023
CLARITHROMYCINE LM 500 mg (Génériques)	Comprimé LM	J01FA09	Macrolides, lincosamides et streptogramines	Macrolides			Réponse laboratoire			Pas d'équivalent LM	A prendre de préférence pendant les repas.	Arrow 15-03-2022 : augmentation du risque de survenue candidose, glosite ou stomatite en cas d'écrasement.	4/18/2023
CLINDAMYCINE 75, 150 et 300 mg (Dalacine)	Gélule	J01FF01	Macrolides, lincosamides et streptogramines	Lincosamides			RCP	Ouvrable selon HUG 03/2023		Non	Ne convient pas aux enfants qui ne peuvent pas avaler les gélules entières.	Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CLOBAZAM 10 et 20 mg (Urbanyl)	Comprimé ou comprimé sécable	N05BA09	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Notice patient			Suspension buvable	Peut être écrasé dans une compote de pommes.		4/18/2023
CLOBAZAM 5 mg (Urbanyl)	Gélule	N05BA09	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Suspension buvable, comprimés écrasables		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	2/5/2024
CLOFAZIMINE 50 et 100 mg (Lamprene)	Capsule molle	J04BA01	Antilépreux	Antilépreux			Galénique			Non	A prendre au cours des repas ou avec du lait.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
CLOMIPRAMINE 10, 25 et 75 mg (Anafranil)	Comprimé ou comprimé sécable	N06AA04	Antidépresseurs	Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Afasigma 08-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CLONAZEPAM 2 mg (Rivotril)	Comprimé sécable	N03AE01	Antiépileptiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable en gouttes		Chepharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
CLONIDINE 0,15 mg (Catapressan)	Comprimé sécable	C02AC01	Antiadrénergiques agissant sur le système nerveux central	Agonistes des récepteurs de l'imidazoline			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		CSP 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer, PA soluble dans l'eau et l'alcool.	4/18/2023
CLOPIDOGREL 75 et 300 mg (Plavix)	Comprimé	B01AC04	Antithrombotiques	Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire sauf héparines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
CLORAZEPATE 5, 10 et 20 mg (Tranxene)	Gélule	N05BA05	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Non		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
CLOTIAZEPAM 5 et 10 mg (Vertran)	Comprimé	N05BA21	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Non	A prendre avec un verre d'eau.	Amdipharm 24-07-2025 : écrasement déconseillé car pas d'étude	7/24/2025
CLOXACILLINE 500 mg (Orbenine)	Gélule	J01CF02	Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines	Pénicillines résistantes aux bêta-lactamases			RCP			Non	A prendre de préférence 30 min avant les repas.	Astellas Pharma 14-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
CLOZAPINE 25 et 100 mg (Leponex)	Comprimé sécable	N05AH02	Antipsychotiques	Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines			Réponse laboratoire			Non		Viatris 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
COBICISTAT / ELVITEGRAVIR / EMTRICITABINE / TENOFOVIR 150/150/200/245 mg (Stribild)	Comprimé	J05AR09	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre pendant les repas.	Gilead 02-03-2022 : écrasement et fractionnement déconseillé car pas d'étude interne, mais d'autres études ont montré une bioeq et tolérance similaire après écrasement.	4/18/2023
CODEINE / EXTRAIT DE GRINDELIA / SULFOGAIACOL 25/20/100 mg (Neocodion)	Comprimé	R05DA04	Antitussifs, sauf associations avec des expectorants	Alcaloïdes de l'opium et dérivés			Réponse laboratoire			Sirap		Bouchara-Recordati 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
COLCHICINE / OPIUM / TIEMONIUM 1/12,5/50 mg (Colchimax)	Comprimé sécable	M04AC01	Médicaments contre la goutte	Médicaments sans effet sur le métabolisme de l'acide urique			Réponse laboratoire			Non	A prendre au moment des repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Laboratoires Mavoly Spindler 26-04-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/26/2023
COLCHICINE 1 mg (Colchicine opocalcium)	Comprimé	M04AC01	Médicaments contre la goutte	Médicaments sans effet sur le métabolisme de l'acide urique			Réponse laboratoire			Non	A prendre au moment des repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Laboratoires Mavoly Spindler 27-06-2025 : peut être écrasé de façon extemporané car pas d'études. A mélanger à de l'alimentation car goût très amer.	6/27/2025
CYAMEMAZINE 25 et 100 mg (Tercian)	Comprimé sécable	N05AA06	Antipsychotiques	Phénothiazines à chaîne latérale aliphatique			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
CYANOCOBALAMINE 250 µg (Vitamine B12, Gerda)	Comprimé sécable	B03BA01	Vitamine B12 et acide folique	Vitamine B12 (cyanocobalamine et dérivés)			Réponse laboratoire			Solution buvable		Substipharm 21-03-2022 : pas d'étude mais écrasement possible si administration immédiate. Photosensible et sensible à l'humidité. Peu soluble dans l'eau.	4/18/2023
CYCLOPHOSPHAMIDE 50 mg (Endoxan)	Comprimé	L01AA01	Alkylants	Analogues des moutardes azotées			RCP			Non	PA cytotoxique. A prendre le matin à jeun avec 2 grands verres d'eau.		4/18/2023
CYPROHEPTADINE 4 mg (Periactine)	Comprimé	R06AX02	Antihistaminiques à usage systémique	Autres antihistaminiques à usage systémique			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le soir (effet sédatif).	Teofarma 08-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.	4/18/2023
CYPROTERONE 50 et 100 mg (Androcur)	Comprimé sécable	G03HA01	Anti-androgènes	Anti-androgènes non associés			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant ou en dehors des repas mais de façon constante, de préférence le repas du matin ou du soir.	Bayer 03-08-2020 : pas d'étude, peut être écrasé mais ne pas diluer.	4/18/2023
CYSTEAMINE 50 et 150 mg (Cystagon)	Géluie	A16AA04	Autres produits pour les voies digestives et le métabolisme	Acides aminés et dérivés			RCP			Non	Mélanger la poudre à des aliments comme le lait, les pommes de terre et autres produits à base d'amidon. Eviter les boissons acides comme le jus d'orange.		4/18/2023
DABIGATRAN 75, 110 et 150 mg (Pradaxa)	Géluie	B01AE07	Antithrombotiques	Inhibiteurs directs de la thrombine			RCP			Non	Risque de surdosage et donc de saignements si ouverture de la géluie.	Boehringer 18-08-2020 : cf. RCP. Sensible à l'humidité.	4/18/2023
DABRAFENIB 50 et 75 mg (Tafinlar)	Géluie	L01EC02	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP			Comprimés dispersibles (AAC)	A prendre à heure fixe, ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. Ne pas ouvrir les géluies en raison de l'instabilité chimique du PA.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
DANTROLENE 25 et 100 mg (Dantrium)	Géluie	M03CA01	Myorelaxants à action directe	Dantrolène et dérivés			Notice patient			Non	A prendre pendant les repas.		4/18/2023
DAPAGLIFLOZINE 10 mg (Forxiga)	Comprimé	A10BK01	Antidiabétiques, insulines exclues	Inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2)			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023					4/18/2023
DAPSONE / FER 100/200 mg (Disulone)	Comprimé sécable	J04BA02	Antilépreux	Antilépreux			RCP			Non	Peut être écrasé et mélangé à un liquide ou un yaourt.		4/18/2023
DARUNAVIR 75, 150, 400, 600 et 800 mg (Prezista)	Comprimé	J05AE10	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de protéase			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable	A prendre à heure fixe s 30 min après les repas ou une collation. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
DASATINIB 20, 50, 70, 100 et 140 mg (Sprycel)	Comprimé	L01EA02	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP			Poudre pour suspension buvable	A prendre à heure fixe. Ne pas écraser pour préserver le dosage et éviter le risque d'exposition cutanée. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
DEFERASIROX 90, 180 et 360 mg (Exjade)	Comprimé	V03AC03	Tous autres médicaments	Chélateurs du fer			RCP			Non	A prendre à heure fixe à jeun ou avec un repas léger. Peut être écrasé dans un yaourt ou une compote pour administration immédiate.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
DES Loratadine 5 mg (Aerius)	Comprimé	R06AX27	Antihistaminiques à usage systémique	Autres antihistaminiques à usage systémique			Thériaque 03/2023			Solution buvable			4/18/2023
DEXAMETHASONE 0,5 mg (Dectancy)	Comprimé	H02AB02	Corticoïdes à usage systémique non associés	Glucocorticoïdes			RCP			Solution buvable (AAC)	Peut être mélangé à l'alimentation.		4/18/2023
DEXAMETHASONE 40 mg (Neofordex)	Comprimé	H02AB02	Corticoïdes à usage systémique non associés	Glucocorticoïdes			Réponse laboratoire			Solution buvable		Theravia 05-05-2025 : Pas d'étude mais écrasement possible si administration immédiate. Peu soluble dans l'eau. Disperser la poudre obtenue dans de l'eau, bien agiter et avaler immédiatement sans laisser de résidu au fond du verre	5/12/2025
DEXCHLORPHENIRAMINE 2 mg (Polaramine)	Comprimé sécable	R06AB02	Antihistaminiques à usage systémique	Alkylamines substituées			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le soir (effet sédatif).	Bayer 30-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
DIACEREINE 50 mg (Art)	Géluie	M01AX21	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Autres anti-inflammatoires antirhumatismaux non stéroïdiens			RCP			Non	A prendre pendant les repas.		4/18/2023
DIAZEPAM 2, 5 et 10 mg (Valium)	Comprimé sécable	N05BA01	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines		?		Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable en gouttes	Eviter le jus de pamplemousse.	En attente (Centre de Spécialités Pharmaceutiques)	4/18/2023
DIAZOXIDE 25 et 100 mg (Proglifem)	Géluie	V03AH01	Tous autres médicaments	Médicaments de l'hypoglycémie			Notice patient			Suspension buvable (AAC)	Mélangeable avec des aliments.		4/18/2023
DICLOFENAC 25 et 50 mg (Voltarene)	Comprimé GR	M01AB05	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide acétique et apparentés			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suppositoires	A prendre de préférence pendant les repas.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
DICLOFENAC LP 75 et 100 mg (Voltarene LP)	Comprimé LP	M01AB05	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide acétique et apparentés			RCP			△ Non LP △ Suppositoires	A prendre de préférence pendant les repas.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
DIETHYLCARBAMAZINE 100 mg (Notezine)	Comprimé sécable	P02CB02	Antinématodes	Pipérazine et dérivés			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence après les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
DIGOXINE 0,125 et 0,25 mg (Hemigoxine, Digoxine)	Comprimé	C01AA05	Glycosides cardiotoniques	Glycosides de la Digitale			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable en gouttes		<u>Teofarma 08-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.	4/18/2023
DIHYDROCODEINE LP 60 mg (Dicodin LP)	Comprimé LP	N02AA08	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			RCP			Non			4/18/2023
DILTIAZEM 60 mg (Tildiem)	Comprimé	C08DB01	Inhibiteurs calciques cardiosélectifs	Dérivés de la benzothiazépine			RCP			Non	A prendre de préférence au début des repas. Eviter le jus de pamplemousse.	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
DILTIAZEM LP 90, 120, 200 et 300 mg (Mono Tildiem LP)	Gélule LP	C08DB01	Inhibiteurs calciques cardiosélectifs	Dérivés de la benzothiazépine			RCP			Non	A prendre à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse.	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/30/2025
DILTIAZEM LP 90 et 120 mg (Bi Tildiem LP)	Comprimé LP	C08DB01	Inhibiteurs calciques cardiosélectifs	Dérivés de la benzothiazépine			RCP						4/30/2025
DIMENHYDRINATE / CAFEINE 50/10 mg (Mercaim)	Comprimé sécable	R06AA61	Antémétiques et antinauséux	Autres antiémétiques			RCP			Sirap (sans caféine)	A prendre 30 min avant le départ. Peut être écrasé dans un verre d'eau sucrée.		4/18/2023
DIOSMINE 300 et 600 mg (Diovenor, Mediveine)	Comprimé	C05CA03	Stabilisateurs des capillaires	Bioflavonoïdes		?				Poudre pour suspension buvable	A prendre de préférence pendant les repas.	En attente (Elerte)	4/18/2023
DIOSMINE 500 et 1000 mg (Daflon)	Comprimé	C05CA03	Stabilisateurs des capillaires	Bioflavonoïdes			Thériaque 03/2023			Poudre pour suspension buvable	Peut être dissout sans l'écraser dans de l'eau. A prendre pendant les repas.		4/18/2023
DIPHENHYDRAMINE 90 mg (Nautamine)	Comprimé	R06AA02	Antihistaminiques à usage systémique	Ethers d'aminoalkyls			RCP			Non	A prendre 30 min avant le départ. Peut être écrasé dans un verre d'eau.		4/18/2023
DIPYRIDAMOLE 75 mg (Persantine)	Comprimé	B01AC07	Antithrombotiques	Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire sauf héparines			Réponse laboratoire			Non		<u>CSP 21-02-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer, PA très peu soluble dans l'eau mais soluble en milieu acide, et présumé photosensible.	4/18/2023
DISOPYRAMIDE 100 mg (Rythmodan)	Gélule	C01BA03	Antiarythmiques de classe I et III	Antiarythmiques, classe Ia			Réponse laboratoire			Non		<u>Cheplapharm 14-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude. Peu soluble dans l'eau.	4/18/2023
DISOPYRAMIDE LP 125 et 250 mg (Isorythm LP)	Gélule LP	C01BA03	Antiarythmiques de classe I et III	Antiarythmiques, classe Ia			Thériaque 03/2023			Non			4/18/2023
DISOPYRAMIDE LP 250 mg (Isorythm LP)	Comprimé LP	C01BA03	Antiarythmiques de classe I et III	Antiarythmiques, classe Ia			Notice patient			Non		<u>Cheplapharm 14-03-2022</u> : cf. RCP	4/18/2023
DISULFIRAME 500 mg (Esperal)	Comprimé	N07BB01	Médicaments des troubles de l'addiction	Médicaments utilisés en cas de dépendance à l'alcool			Réponse laboratoire			Non	A prendre le matin pendant les repas, après ≥ 24h d'abstinence d'alcool.	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
DIVALPROATE 250 et 500 mg (Depakote, Divalcote)	Comprimé GR	N03AG01	Thymorégulateur	Dérivés d'acides gras			Notice patient			Non			11/9/2023
DOLUTEGRAVIR 50 mg (Tivicay)	Comprimé	J05AJ03	Antiviraux à action directe	Autres antiviraux			RCP	Ecrasable selon HUG 07/2020		Comprimés dispersibles Δ Adaptation posologique Δ	La biodisponibilité des comprimés dispersibles est 1,6 fois supérieure à celle des comprimés pelliculés.		4/18/2023
DOMPERIDONE 10 mg (Motilium)	Comprimé	A03FA03	Propulsifs	Propulsifs			Notice patient			Comprimés orodispersibles, suspension buvable	A prendre de préférence avant les repas (absorption plus rapide). Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
DONEPEZIL 5 et 10 mg (Aricept)	Comprimé	N06DA02	Médicaments contre la démence	Anticholinestérasiques			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés orodispersibles	A prendre avant le coucher. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
DOSULEPINE 25 mg (Prothiaden)	Gélule	N06AA16	Antidépresseurs	Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines			Réponse laboratoire			Non		<u>Teofarma 08-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude.	4/18/2023
DOSULEPINE 75 mg (Prothiaden)	Comprimé	N06AA16	Antidépresseurs	Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines			Réponse laboratoire			Non		<u>Teofarma 08-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
DOXYCYCLINE 50 et 100 mg (Doxy, Doxypalu, Doxylys, Granudoxy)	Comprimé sécable	J01AA02	Tétracyclines	Tétracyclines			RCP			Non	Peut être dissout sans l'écraser dans ½ verre d'eau. A prendre pendant les repas. Ne pas s'allonger jusqu'à 1 h après la prise (risque d'ulcération de l'œsophage). Ne pas prendre avec du lait (diminue l'absorption).		4/18/2023
DULOXETINE 30 et 60 mg (Cymbalta)	Gélule GR	N06AX21	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			Notice patient	Ouvrable selon HUG 03/2023		Non		<u>Lilly 06-08-2020</u> : la dose doit être avalée entière afin de ne pas pour endommager le revêtement entérique.	4/18/2023
DUTASTERIDE 0,5 mg (Avodart)	Capsule molle	G04CB02	Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate	Inhibiteurs de la 5α-réductase			RCP			Non	PA irritant pour la muqueuse oropharyngée. Ne pas faire manipuler par une femme enceinte.		4/18/2023
DYDROGESTERONE 10 mg (Duphaston)	Comprimé	G03DB01	Progestatifs	Dérivés pregnadiène			RCP			Non	A prendre de préférence à heure fixe.	<u>Viatrix 17-02-2023</u> : cf. RCP	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
EFAVIRENZ / ETRICITABINE / TENOFOVIR 600/200/245 mg (génériques)	Comprimé	J05AR06	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			RCP			Écrasable, gélule ouvrable, Etricitabine granulée et Tenofovir solution buvable	A prendre en dehors des repas et de préférence le soir pour améliorer la tolérance.		4/18/2023
EFAVIRENZ 50, 100 et 200 mg (Sustiva)	Gélule	J05AG03	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique			RCP			Non	A prendre en dehors des repas et de préférence le soir pour améliorer la tolérance. Peut être administré immédiatement dans une petite quantité de nourriture (1-2 cuillères à café). Ne pas manger pendant ≤ 2 heures après.		4/18/2023
EFAVIRENZ 600 mg (génériques)	Comprimé	J05AG03	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique			Notice patient			Gélules ouvrables	A prendre en dehors des repas et de préférence le soir pour améliorer la tolérance.		4/18/2023
ELETRIPTAN 20 et 40 mg (Relpax)	Comprimé	N02CC06	Antimigraineux	Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1			RCP			Non	A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible.		4/18/2023
ELTROMBOPAG 25, 50 et 75 mg (Revolade)	Comprimé	B02BX05	Vitamine K et autres hémostatiques	Autres hémostatiques systémiques			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Poudre pour suspension buvable	Ne pas consommer ≤ 4h avant ou ≤ 2h après la prise d'Éltrombopag de lait et produits laitiers, d'antiacides ni de compléments minéraux (fer, calcium, magnésium, zinc, sélénium, aluminium...).	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
EMPAGLIFLOZINE 10 et 25 mg (Jardiance)	Comprimé	A10BK03	Antidiabétiques, insulines exclues	Inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2)			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre avec ou sans aliments, avalés entiers avec de l'eau.	Lilly 27/11/2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
EMTRICITABINE / RILPIVIRINE / TENOFOVIR 200/25/245 mg (Eviplera)	Comprimé	J05AR08	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Gilead 02-03-2022 : écrasement et fractionnement déconseillés car pas d'étude.	4/18/2023
EMTRICITABINE / TENOFOVIR 200/245 mg (Truvada)	Comprimé	J05AR03	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			Notice patient			Solution buvable de Tenofovir et granules d'Emtricitabine	A prendre de préférence pendant les repas. Peut être écrasé ou délité dans un verre d'eau, de jus d'orange ou de raisin. Administration immédiate.		4/18/2023
EMTRICITABINE 200 mg (Emtriva)	Gélule	J05AF09	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique			RCP	Ouvrable selon HUG 03/2023		Solution buvable Δ Adaptation posologique Δ	La prise d'une gélule de 200 mg équivaut à la prise de 240 mg via la solution buvable.		4/18/2023
ENALAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 20/12,5 mg (Co-Renitec)	Comprimé	C09BA02	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques		?				Non		En attente (Organon)	4/18/2023
ENALAPRIL 5 et 20 mg (Renitec)	Comprimé sécable	C09AA02	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association		?				Non		En attente (Organon)	4/18/2023
ENTACAPONE 200 mg (Comtan)	Comprimé	N04BX02	Dopaminergiques	Autres dopaminergiques	G	E	Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Immediate administration via a nasogastric or PEG tube, and the tube rinsed thereafter. It is also possible to dissolve it in e.g. apple juice for an occasional need of immediate administration via tube. r. 1 Patients should not	4/18/2023
ENTECAVIR 0,5 et 1 mg (Baraclude)	Comprimé	J05AF10	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable	Peut nécessiter d'être pris à jeun (≥ 2h à distance des repas) dans les formes compliquées d'hépatite.	Bristol Myers Squibb 28-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
EPLERENONE 25 et 50 mg (Inspra)	Comprimé	C03DA04	Diurétiques épargneurs potassiques	Antagonistes de l'aldostérone			Thériaque 03/2023	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	Eviter le jus de pamplemousse.	En attente (Viatrix)	4/18/2023
ERLOTINIB 25, 100 et 150 mg (Tarceva)	Comprimé	L01EB02	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Roche 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ESCITALOPRAM 5, 10, 15 et 20 mg (Seroplex)	Comprimé ou comprimé sécable	N06AB10	Antidépresseurs	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)			Notice patient			Solution buvable en gouttes			4/18/2023
ESLICARBAZEPINE 800mg	Comprimé	N03AF04	Antiépileptiques	Dérivés des carboxamides			RCP			Non	Peut être écrasé et mélangé à de l'eau ou à des aliments semi-liquides, tels que de la compote de pommes, juste avant leur administration par voie orale		6/26/2024
ESOMEPRAZOLE 20 et 40 mg (génériques)	Gélule GR	A02BC05	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Inhibiteurs de la pompe à protons			RCP			Granulés GR	Peut être vidé dans ½ verre d'eau plate et administré dans un délai de 30 min. Ne pas utiliser d'autre liquide pour ne pas dissoudre l'enrobage entérique.		4/18/2023
ESOMEPRAZOLE 20 et 40 mg (Inexium)	Comprimé GR	A02BC05	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Inhibiteurs de la pompe à protons			RCP			Granulés GR	Peut être dissout sans l'écraser dans ½ verre d'eau plate et administré dans un délai de 30 min. Ne pas utiliser d'autre liquide pour ne pas dissoudre l'enrobage entérique.		4/18/2023
ESTERS ETHYLIQUES 90 D'ACIDES OMEGA-3 1000 mg (Omacor)	Capsule molle	C10AX06	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Autres agents réduisant les lipides sériques			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence pendant les repas.	Pierre Fabre 21-02-2022 : risque d'oxydation à l'air de l'huile si ouverture	4/18/2023
ESTRAMUSTINE 140 mg (Estracyl)	Gélule	L01XX11	Autres antinéoplasiques	Autres antinéoplasiques			RCP			Non	A prendre ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. PA irritant et cytotoxique.		4/18/2023
ETAMSYLATE 250 et 500 mg (Dicynone)	Comprimé	B02BX01	Vitamine K et autres hémostatiques	Autres hémostatiques systémiques			RCP			Solution injectable par voie orale diluée dans ½ verre d'eau			4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
ETHAMBUTOL 500 mg (Dexambuto)	Comprimé	J04AK02	Antituberculeux	Autres antituberculeux			RCP			Non	Mélangeable à l'alimentation ou une boisson.		4/18/2023
ETIFOXINE 50 mg (Stresam)	Gélule	N05BX03	Anxiolytiques	Autres anxiolytiques			Réponse laboratoire			Non		Biocodex 09/04/2024 : Possibilité d'ouvrir les gélules. L'enveloppe sert à masquer le goût probablement amer du PA.	4/11/2024
ETILEFRINE 5 mg (Effortil)	Comprimé	C01CA01	Cardiotoniques sauf les glycosides cardiotoniques	Adrénérgiques et dopaminérgiques			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes		Serb 22-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
ETOPOSIDE 50 mg (Celltop)	Capsule molle	L01CB01	Alcaloïdes végétaux et autres produits d'origine naturelle	Dérivés de la podophylotoxine			Notice patient			Non	A prendre à jeun.	En attente (Baxter)	4/18/2023
EVEROLIMUS 0,5 ; 0,75 ; 2,5 ; 5 et 10 mg (Votubia, Certican, Afinitor)	Comprimé	L04AA18	Immunosuppresseurs	Immunosuppresseurs sélectifs			RCP			Comprimés dispersibles	A prendre à heure fixe, avec ou sans aliments mais de façon constante. PA cytotoxique. Eviter le jus de pamplemousse.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
EXEMESTANE 25 mg (Aromasine)	Comprimé	L02BG06	Antihormones et apparentés	Inhibiteurs de l'aromatase			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	PA tératogène. A prendre à heure fixe, de préférence après les repas.	Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
EXTRAIT DE FEUILLES DE GINKGO BILOBA 40 mg (Tanakan)	Comprimé	N06DX02	Médicaments contre la démence	Autres médicaments contre la démence			Réponse laboratoire			Solution buvable	A prendre pendant les repas.	Ipsen 18-02-2022 : pas d'opposition au broyage hormis le goût amer, ni au mélange avec les boissons ou aliments. PA hydrosoluble, mais certains excipients sont insolubles.	4/18/2023
EXTRAIT DU FRUIT DE PALMIER DE FLORIDE 160 mg (Permixon)	Gélule	G04CX02	Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate	Autres médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas.	Pierre Fabre 21-02-2022 : risque d'oxydation et de troubles digestifs si gélule ouverte.	4/18/2023
EXTRAIT PURIFIE DE PEPIN DE RAISIN 150 mg (Endotelon)	Comprimé GR	C05CX	Médicaments agissant sur les capillaires	Autres médicaments agissant sur les capillaires			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence en dehors des repas.	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
EZETIMIBE 10 mg (Ezetrol)	Comprimé	C10AX09	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Autres agents réduisant les lipides sériques		?		Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		En attente (Organon)	4/18/2023
FAMCICLOVIR 125 et 500 mg (Oravir)	Comprimé	J05AB09	Antiviraux à action directe	Nucléosides et nucléotides sauf inhibiteurs de la transcriptase inverse		?				Non		En attente (Centre de Specialites Pharmaceutiques)	4/18/2023
FEBUXOSTAT 80 et 120 mg (Adenuric)	Comprimé	M04AA03	Inhibiteurs de la synthèse d'acide urique	Uricosurique			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	Peut-être pris au cours ou en dehors des repas	MENARINI 04-01-2024 : écrasement déconseillé car pas d'étude	1/5/2024
FELODIPINE LP 5 mg (Flodil)	Comprimé LP	C08CA02	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			RCP			Non	A prendre le matin en dehors des repas ou après un repas léger, pauvre en graisse et en sucre. Eviter le jus de pamplemousse.	AstraZeneca 06-04-2022 : cf. RCP.	4/18/2023
FENOFRIBATE 145 et 160 mg (Lipanthyl)	Comprimé	C10AB05	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Fibrates			Notice patient			Non			4/18/2023
FENOFRIBATE 67 et 200 mg (Lipanthyl micronisé)	Gélule	C10AB05	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Fibrates			RCP	Ouvrable selon HUG 03/2023		Non	A prendre pendant les repas.	Viatrix 17-02-2023 : cf. RCP	4/18/2023
FIDAXOMICINE 200 mg (Dificlir)	Comprimé	A07AA12	Antiseptiques intestinaux	Antibiotiques			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Granulés pour suspension buvable			4/18/2023
FINASTERIDE 5 mg (Chibro-Proscar)	Comprimé	G04CB01	Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate	Inhibiteurs de la 5α-réductase			RCP			Non	Ne pas faire manipuler de comprimé cassé par une femme enceinte		4/18/2023
FINGOLIMOD 0,25 et 0,5 mg (Gilenya)	Gélule	L04AA27	Immunosuppresseurs	Immunosuppresseurs sélectifs			RCP			Non		Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
FLECAINIDE 100 mg (Flecaine)	Comprimé sécable	C01BC04	Antiarythmiques de classe I et III	Antiarythmiques, classe Ic			Réponse laboratoire			Non		Viatrix 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
FLECAINIDE LP 50, 100, 150 et 200 mg (Flecaine LP)	Gélule LP	C01BC04	Antiarythmiques de classe I et III	Antiarythmiques, classe Ic			Réponse laboratoire			Non		Viatrix 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
FLUBENDAZOLE 100 mg (Fluvermal)	Comprimé sécable	P02CA05	Antinématodes	Dérivés du benzimidazole			RCP			Suspension buvable	Peut être croqué pendant les repas.		4/18/2023
FLUCONAZOLE 50, 100, 150 et 200 mg (Beagyne, Triflucan)	Gélule	J02AC01	Antimycosiques à usage systémique	Dérivés triazolés			RCP			Poudre pour suspension buvable	A prendre de préférence à heure fixe.	Pfizer 04-08-2020 : ouverture déconseillée car hors-AMM. Une étude montre la possibilité d'ouvrir les gélules pour administration en SNG. Peu hydrosoluble.	4/18/2023
FLUCYTOSINE 500 mg (Ancotil)	Comprimé sécable	J02AX01	Antimycosiques à usage systémique	Autres antimycosiques à usage systémique			Réponse laboratoire				PA cytotoxique. Possibilité de broyer les comprimés si administration immédiate.	comme le port de gants, masque et lunettes de protection lors de la préparation et de l'administration. Il convient d'éviter l'exposition des femmes enceintes ou des femmes qui	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
FLUDROCORTISONE 50 µg (Flucortac)	Comprimé sécable	H02AA02	Corticoïdes à usage systémique non associés	Minéralocorticoïdes			RCP			Non	A dissoudre dans de l'eau ou du jus de fruit. Administration immédiate car PA sensible à l'humidité.	HAC Pharma 22-02-2022 : cf RCP	4/18/2023
FLUIDIONE 20 mg (Previscan)	Comprimé sécable	B01AA12	Antithrombotiques	Antivitamines K			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le soir.	Merck 07-05-2022 : Pas de données de stabilité après broyage, décision du broyage laissée à l'appréciateur de l'utilisateur /M MTE	5/12/2025
FLUNARIZINE 10 mg (Sibelium)	Comprimé sécable	N02CX	Antimigraineux	Autres antimigraineux			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le soir (effet sédatif).	Janssen 09-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
FLUOXETINE 20 mg (Prozac)	Gélule	N06AB03	Antidépresseurs	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)			Notice patient			Comprimés dispersibles, solution buvable			4/18/2023
FLURBIPROFENE 50 et 100 mg (Cebutid)	Comprimé	M01AE09	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			Non	A prendre de préférence pendant les repas.		4/18/2023
FLURBIPROFENE LP 200 mg (Cebutid LP)	Gélule LP	M01AE09	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			Non	A prendre de préférence pendant les repas.	Almirall SAS France 09-05-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude d'efficacité, de biodisponibilité, de stabilité et de sécurité	4/18/2023
FLUVASTATINE 20 et 40 mg (génériques)	Gélule	C10AA04	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)			RCP			Non	A prendre matin et soir ou seulement le soir.		4/18/2023
FLUVASTATINE LP 80 mg (Lescol LP)	Comprimé LP	C10AA04	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)			RCP			Non		Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
FLUVOXAMINE 50 et 100 mg (Floxyfral)	Comprimé sécable	N06AB08	Antidépresseurs	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Viatis 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
FOSAMPRENAVIR 700 mg (Telzir)	Comprimé	J05AE07	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de protéase			Notice patient			Suspension buvable Δ Administration Δ	La suspension buvable (mais pas les comprimés) doit être prise à jeun en dehors des repas chez l'adulte, et pendant les repas chez l'enfant ou l'adolescent.		4/18/2023
FOSINOPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 20/12,5 mg (génériques)	Comprimé sécable	C09BA09	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques			Réponse laboratoire			Non		Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais les études rapportent un écrasement possible.	4/18/2023
FOSINOPRIL 10 et 20 mg (génériques)	Comprimé sécable	C09AA09	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association			Réponse laboratoire	Ecrasable selon laboratoire		Non		Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais les études rapportent un écrasement possible.	4/18/2023
FUMARATE FERREUX 66 mg (Fumafer)	Comprimé	B03AA02	Préparations martiales	Préparations orales de fer bivalent			Réponse laboratoire			Solution buvable	Horaire de la prise à adapter en fonction de la tolérance digestive.	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.	4/18/2023
FUROSEMIDE 20, 40, 500 mg (Lasilix faible, Lasilix, Lasilix special)	Comprimé ou comprimé sécable	C03CA01	Diurétiques de l'anse	Sulfamides non associés			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
FUROSEMIDE LP 60 mg (Lasilix retard)	Gélule LP	C03CA01	Diurétiques de l'anse	Sulfamides non associés			Réponse laboratoire			Δ Non LP Δ Solution buvable	A prendre le matin avant le petit-déjeuner.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
GABAPENTINE 100, 300 et 400 mg (Neurontin)	Gélule	N03AX12	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			Réponse laboratoire	Ouvrable selon HUG 03/2023		Solution buvable (AAC)	Goût amer.	Pfizer 04-08-2020 : ouvrable si administration immédiate. A mélanger à un aliment pour masquer l'amertume. Une étude indique que l'ouverture n'influe pas sur l'absorption.	4/18/2023
GABAPENTINE 600 et 800 mg (Neurontin)	Comprimé sécable	N03AX12	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Gélules ouvrables, solution buvable (AAC)		En attente (Viatis)	4/18/2023
GLIBENCLAMIDE 2,5 et 5 mg (génériques)	Comprimé sécable	A10BB01	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Sulfonylurées			Réponse laboratoire			Solution buvable (AAC)	A prendre au début des repas.	Arrow 04-05-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude, mais possible selon des sources extérieures. Goût amer.	6/30/2023
GLICLAZIDE 80 mg (génériques)	Comprimé sécable	A10BB09	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Sulfonylurées		?		Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		En attente (génériques)	4/18/2023
GLICLAZIDE LM 30, 60 mg (Diamicon)	Comprimé LM ou comprimé sécable LM	A10BB09	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Sulfonylurées			RCP			Non	A prendre au petit-déjeuner. Ne pas croquer (risque d'hypoglycémie).	Servier 28-02-2022 : cf. RCP	9/19/2023
GLIMEPIRIDE 1, 2, 3 et 4 mg (Amarel)	Comprimé	A10BB12	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Sulfonylurées			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre au début du premier repas principal de la journée.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
GLIPIZIDE LP 5 et 10 mg (Ozidia)	Comprimé LP	A10BB07	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Sulfonylurées			RCP			Non	A prendre pendant les repas, en général le petit-déjeuner.	Pfizer 14-03-2023 : cf RCP.	4/18/2023
GRANISETRON 1 et 2 mg (Kytril)	Comprimé	A04AA02	Antémétiques et anti-nauséux	Antagonistes de la sérotonine (5-HT3)			RCP			Non			4/18/2023
HALOPERIDOL 1 et 5 mg (Haldol)	Comprimé	N05AD01	Antipsychotiques	Dérivés de la butyrophénone			Thériaque 03/2023			Solution buvable	Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg (Esidrex)	Comprimé sécable	C03AA03	Diurétique low-ceiling et thiazidiques	Thiazidiques non associés			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Juvisse Pharmaceuticals 31-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
HYDROCORTISONE 10 mg	Comprimé sécable	H02AB09	Corticoïdes à usage systémique non associés	Glucocorticoïdes			RCP			Non	Peut être mélangé à l'alimentation.		4/18/2023
HYDROMORPHONE LP 4, 8, 16 et 24 mg (Sophidone LP)	Gélule LP	N02AA03	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			RCP			Non	Peut être mélangé dans un aliment semi-solide (purée, confiture, compote, yaourt...). Ne pas dissoudre les granules pour maintenir l'enveloppe gastro-résistante. Administration immédiate.	Mundipharma 03-08-2020 : cf. RCP	4/18/2023
HYDROQUINIDINE LP 300 mg (Serecor)	Gélule LP	C01BA13	Antiarythmiques de classe I et III	Antiarythmiques, classe Ia			Notice patient			Non		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
HYDROXYCARBAMIDE 500 mg (Hydrea)	Gélule	L01XX05	Autres antinéoplasiques	Autres antinéoplasiques			RCP			Non	PA cytostatique : en cas d'ouverture porter des gants protecteurs, un masque et éviter toute inhalation ou contact avec la peau ou les muqueuses. Vider la gélule dans un verre d'eau et administrer immédiatement.		4/18/2023
HYDROXYCHLOROQUINE 200 mg (Plaquenil)	Comprimé	D11AX	Autres préparations dermatologiques	Autres préparations dermatologiques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre après les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
HYDROXYZINE 25 mg (Atarax)	Comprimé ou comprimé sécable	N05BB01	Anxiolytiques	Dérivés du diphenylméthane			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Sirop	Ne pas laisser fondre sous la langue.	UCB Pharma 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.	4/18/2023
IBUPROFENE / PSEUDOEPHEDRINE 200/30 mg (Rhinadivil)	Comprimé	R01BA52	Décongestionnants nasaux à usage systémique	Sympathomimétiques			RCP			Non	A prendre de préférence pendant les repas. L'écrasement majore les effets indésirables.	GSK 17-02-2022 : non-écrasable car pas d'étude. Goût amer.	4/18/2023
IBUPROFENE 100, 200 et 400 mg (Advil, Nurofen, etc.)	Comprimé	M01AE01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			Comprimés orodispersibles, granulés pour suspension buvable	A prendre de préférence pendant les repas.	GSK 17-02-2022 : non-écrasable car pas d'étude. Goût amer.	4/18/2023
IBUPROFENE 200 et 400 mg (Advilcaps, Nurofencaps)	Capsule molle	M01AE01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			Comprimés orodispersibles, granulés pour suspension buvable	A prendre de préférence pendant les repas. L'écrasement majore les effets indésirables.	GSK 17-02-2022 : non-écrasable car pas d'étude. Goût amer.	4/18/2023
IMATINIB 100 et 400 mg (Glivec)	Comprimé	L01EA01	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP			Non	PA cytotoxique. Peut être dispersé sans l'écraser dans un verre d'eau plate ou de jus de pomme (environ 50 mL pour un comprimé de 100 mg, ou 200 mL pour celui de 400 mg). Administration immédiate.		4/18/2023
IMIPRAMINE 10 et 25 mg (Tofranil)	Comprimé	N06AA02	Antidépresseurs	Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines		?				Non		En attente (Centre de Spécialités Pharmaceutiques)	4/18/2023
INDAPAMIDE 2,5 mg (Fludex)	Comprimé	C03BA11	Diurétiques low-ceiling sauf les thiazidiques	Sulfamides non associés			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le matin.	Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
INDAPAMIDE LP 1,5 mg (Fludex LP)	Comprimé LP	C03BA11	Diurétiques low-ceiling sauf les thiazidiques	Sulfamides non associés			RCP			Non	A prendre de préférence le matin.		4/18/2023
INDOMETACINE 25 mg (Indocid)	Gélule	M01AB01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide acétique et apparentés			Réponse laboratoire			Suppositoires, suspension buvable (AAC)	A prendre de préférence pendant les repas pour améliorer la tolérance digestive.	HAC Pharma 22-02-2022 : ouverture possible si besoin, avec administration immédiate et protection appropriée de l'opérateur	4/18/2023
INDOMETACINE 75 mg (Chrono-indocid)	Gélule LP	M01AB01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide acétique et apparentés			Notice patient	Ouvrable selon laboratoire		Δ Non LP Δ Suppositoires, suspension buvable (AAC)	A prendre de préférence pendant les repas pour améliorer la tolérance digestive.	HAC Pharma 22-02-2022 : ouverture possible si nécessaire uniquement, avec administration immédiate et protection appropriée de l'opérateur	4/18/2023
IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 150/12,5 ; 300/12,5 et 300/25 mg (Coaprovel)	Comprimé	C09DA04	Antagonistes de l'angiotensine II en associations	Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
IRBESARTAN 75, 150 et 300 mg (Aprovel)	Comprimé	C09CA04	Antagonistes de l'angiotensine II non associés	Antagonistes de l'angiotensine II non associés			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ISAVUCONAZOLE 100mg (Cresemba)	Gélule	J02AC05	Antimycosiques à usage systémique,	Dérivés triazolés et tétrazolés			RCP	Ouvrable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe pendant ou en dehors du repas.	Prizer 28-06-2024 : Plusieurs études montrent que l'administration par sonde après ouverture des gélules atteint des concentrations équivalentes à une administration intacte des gélules	7/2/2024
ISONIAZIDE 50, 150mg (Rimifon)	Comprimé	J04AC01	Antituberculeux	Hydrazides			Réponse laboratoire			Non	Avaler les comprimés avec un verre d'eau, en une prise quotidienne, le matin à jeun, en respectant une durée de 30 minutes avant la prise d'aliments	Euroden Pharma 26/06/2025 : pas de données concernant la possibilité d'écraser les comprimés.	6/26/2025
ISONIAZIDE / PYRAZINAMIDE / RIFAMPICINE 50/300/120 mg (Rifater)	Comprimé	J04AM05	Antituberculeux	Antituberculeux en associations			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence à jeun (≥ 30 min avant les repas).	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ISONIAZIDE / RIFAMPICINE 150/300 mg (Rifinah)	Comprimé	J04AM02	Antituberculeux	Antituberculeux en associations			Réponse laboratoire			Non	A prendre le matin à jeun (≥ 30 min avant les repas).	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ISRADIPINE LP 2,5 et 5 mg (Icaz LP)	Gélule LP	C08CA03	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			RCP			Non	A prendre le matin.	DB Pharma 21-02-2022 : pas d'informations complémentaires au RCP	4/18/2023
ITRACONAZOLE 100 mg (Sporanox)	Gélule	J02AC02	Antimycosiques à usage systémique	Dérivés triazolés			RCP			Non	A prendre en fin de repas. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
IVABRADINE 5 et 7,5 mg (Procoralan)	Comprimé	C01EB17	Autres médicaments pour le cœur	Autres médicaments pour le cœur			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Arrow 15-03-2022 : l'ensemble des sources bibliographiques rapportent un écrasement possible.	4/18/2023
IVERMECTINE 3 mg (Stromectol)	Comprimé	P02CF01	Antinématodes	Avermectines			RCP			Non	A prendre à jeun (≥ 2h avant ou après les repas).		4/18/2023
JOSAMYCINE 500 mg (Josacine)	Comprimé	J01FA07	Macrolides, lincosamides et streptogramines	Macrolides			Réponse laboratoire			Comprimés dispersibles, granulés pour suspension buvable		Astellas Pharma 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
KETOPROFENE 25, 100 et 150 mg (Ketum, Toprec, Profenid, Profemigr, etc.)	Comprimé ou comprimé sécable	M01AE03	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			Suppositoires, suspension buvable	A prendre de préférence pendant les repas ou une collation pour améliorer la tolérance digestive.		4/18/2023
KETOPROFENE 50 mg (Profenid)	Gélule	M01AE03	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			Suppositoires	A prendre de préférence pendant les repas ou une collation pour améliorer la tolérance digestive.		4/18/2023
KETOPROFENE LP 100 et 200 mg (Bi profenid)	Comprimé LP	M01AE03	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			△ Non LP △ Suppositoires	A prendre de préférence pendant les repas ou une collation pour améliorer la tolérance digestive.		4/18/2023
KETOPROFENE LP 200 mg (Profenid LP)	Gélule LP	M01AE03	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			△ Non LP △ Suppositoires	A prendre de préférence pendant les repas ou une collation pour améliorer la tolérance digestive.		4/18/2023
KETOTIFENE 1 mg (Zaditen)	Gélule	R06AX17	Antihistaminiques à usage systémique	Autres antihistaminiques à usage systémique			Réponse laboratoire			Solution buvable	A prendre de préférence le soir pendant les repas.	Alfasigma 08-04-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude.	4/18/2023
KETOTIFENE LP 2 mg (Zaditen LP)	Comprimé LP	R06AX17	Antihistaminiques à usage systémique	Autres antihistaminiques à usage systémique			RCP			△ Non LP △ Solution buvable	A prendre de préférence le soir pendant les repas.		4/18/2023
LABETALOL 200 mg (Trandate)	Comprimé	C07AG01	Bêtabloquants	Alpha et bêta-bloquants			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence en fin de repas.	ASPEN Pharma 04-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude interne.	4/18/2023
LACOSAMIDE 50, 100, 150 et 200 mg (Vimpat)	Comprimé	N03AX18	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Sirop	A prendre avec ou sans nourriture.	UCB 24-04-2024 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/23/2024
LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE 150/300 mg (Combivir)	Comprimé sécable	J05AR01	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solutions buvables	Peut être écrasé et mélangé à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide. Administration immédiate. A prendre de préférence à jeun.		4/18/2023
LAMIVUDINE 100, 150 et 300 mg (EpiVir)	Comprimé	J05AF05	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique			RCP			Solution buvable	Peut être écrasé et mélangé à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide. Administration immédiate.		4/18/2023
LANSOPRAZOLE 15 et 30 mg (Ogast)	Gélule GR	A02BC03	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Inhibiteurs de la pompe à protons			RCP			Comprimés orodispersibles	Peut être ouvert et vidé dans un peu d'eau, de jus de pomme ou de tomate, ou saupoudrés dans un peu de nourriture semi-liquide (yaourt, compote). Administration immédiate. A prendre de préférence 30 min avant un repas.	Takeda 04-08-2020 : cf. RCP	4/18/2023
LEDIPASVIR / SOFOSBUVIR 90/400 mg (Harvoni)	Comprimé	J05AP51	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VHC			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	Né pas écraser car goût très amer.	Gilead 02-03-2022 : écrasement et fractionnement déconseillés car pas d'étude et goût très amer si broyé.	4/18/2023
LEFLUNOMIDE 10, 20 et 100 mg (Arava)	Comprimé	L04AA13	Immunosuppresseurs	Immunosuppresseurs sélectifs			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	PA cytotoxique.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LENALIDOMIDE 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 mg (Revlimid)	Gélule	L04AX04	Immunosuppresseurs	Autres immunosuppresseurs			RCP			Non	PA cytotoxique et tératogène. A prendre à heure fixe.	Bristol Myers Squibb 28-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
LERCANIDIPINE 10 et 20 mg (Lercan, Zandip)	Comprimé ou comprimé sécable	C08CA13	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			Réponse laboratoire	Zandip - Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence le matin à jeun (≥ 15 min avant les repas). Eviter le jus de pamplemousse.	Bouchara-Recordati 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LETROZOLE 2,5 mg (Femara)	Comprimé	L02BG04	Antihormones et apparentés	Inhibiteurs de l'aromatase			RCP			Non	A prendre de préférence à heure fixe.	Novartis 10-08-2020 : cf. RCP. Très peu hydrosoluble.	4/18/2023
LEVETIRACETAM 250, 500 et 1000 mg (Keppra)	Comprimé ou comprimé sécable	N03AX14	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable, granulés	A prendre à heure fixe avec une quantité suffisante de liquide et peuvent être pris au cours ou en dehors des repas.	UCB 07-12-2022 : les comprimés de Keppra® ne sont pas sécables. Pour information, Keppra® existe en solution buvable (100mg/ml) et dans le cas où la voie orale est indisponible, la solution à diluer pour perfusion Keppra est une alternative.	4/18/2023
LEVOCETIRIZINE 5 mg (Xyzall)	Comprimé	R06AE09	Antihistaminiques à usage systémique	Dérivés de la pipérazine			RCP			Non		UCB Pharma 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
LEVODOPA / BENSERAZIDE 50/12,5 ; 100/25 et 200/50 mg (Modopar)	Gélule	N04BA02	Dopaminergiques	Dopa et dérivés			RCP	Ouvrable selon HUG 03/2023		Comprimés dispersibles	A prendre ≥ 30 min avant les repas ou ≥ 2h après.		4/18/2023
LEVODOPA / BENSERAZIDE LP 100/25 mg (Modopar LP)	Gélule LP	N04BA02	Dopaminergiques	Dopa et dérivés			RCP			△ Non LP △ Comprimés dispersibles	A prendre ≥ 30 min avant les repas ou ≥ 2h après.		11/9/2023
LEVODOPA / CARBIDOPA / ENTACAPONE tous dosages (Stalevo)	Comprimé	N04BA03	Dopaminergiques	Dopa et dérivés			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	Notice patient : ne pas écraser		4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
LEVODOPA / CARBIDOPA 100/10 et 250/25 mg (Sinemet)	Comprimé	N04BA02	Dopaminergiques	Dopa et dérivés			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Gel intestinal (pour stades avancés)	A prendre en fin de repas, ou avec un peu de nourriture.		4/18/2023
LEVODOPA / CARBIDOPA LP 100/25 et 200/50 mg (Sinemet LP)	Comprimé LP	N04BA02	Dopaminergiques	Dopa et dérivés			RCP			Δ Non LP Δ Gel intestinal (pour stades avancés)	A prendre en début de repas, ou avec un peu de nourriture.		4/18/2023
LEVOFLOXACINE 500 mg (Tavanic)	Comprimé sécable	J01MA12	Quinolones antibactériennes	Fluoroquinolones			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à distance (> 2h) des sels de fer, d'antiacides et de sucralfate qui peuvent diminuer l'absorption.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LEVOMEPRIMAZINE 25 et 100 mg (Nozinan)	Comprimé sécable	N05AA02	Antipsychotiques	Phénothiazines à chaîne latérale aliphatique			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable en gouttes	A prendre le soir ou à répartir en 3 prises au moment des repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LEVOTHYROXINE 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 et 200 µg (L-Thyroxin)	Comprimé sécable	H03AA01	Préparations thyroïdiennes	Hormones thyroïdiennes			RCP			Solution buvable en gouttes	Peut être dissout sans l'écraser dans 10-15 mL d'eau jusqu'à obtenir une suspension, à administrer immédiatement avec un peu d'eau supplémentaire. A prendre le matin à jeun ≥ 30 min avant les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LEVOTHYROXINE 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 et 200 µg (Levothyrox)	Comprimé sécable	H03AA01	Préparations thyroïdiennes	Hormones thyroïdiennes			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes	A prendre le matin à jeun.	Merck 07-05-2025 : écrasement possible, à dissoudre dans 5 à 10mL d'eau, pas d'étude de stabilité, à boire immédiatement	5/12/2025
LINEZOLIDE 600 mg (Zyvoxid)	Comprimé	J01XX08	Autres antibactériens	Autres antibactériens			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Granulés pour suspension buvable		En attente (Pfizer)	4/18/2023
LIOthyRONINE 0,025 mg (Cynomel)	Comprimé sécable	H03AA02	Préparations thyroïdiennes	Hormones thyroïdiennes			Réponse laboratoire			Non	A prendre le matin à jeun.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LISINAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 20/12,5 mg (Zestoretic)	Comprimé sécable	C09BA03	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence à heure fixe.		4/18/2023
LISINAPRIL 5 et 20 mg (Zestril)	Comprimé ou comprimé sécable	C09AA03	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe.		4/18/2023
LITHIUM 250 mg (Teralthie)	Comprimé sécable	N05AN01	Antipsychotiques	Lithium			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre pendant les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LITHIUM LP 400 mg (Teralthie LP)	Comprimé sécable LP	N05AN01	Antipsychotiques	Lithium			RCP			Δ Non LP Δ Lithium 250 mg écrasable	A prendre le soir vers 20h pendant les repas.		4/18/2023
LOPERAMIDE 2 mg (Diaretyl)	Géule	A07DA03	Antipropulsifs	Antipropulsifs			Réponse laboratoire			Comprimés orodispersibles, solution buvable		Janssen 09-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	9/19/2023
LOPINAVIR / RITONAVIR 100/25 et 200/50 mg (Kaletra)	Comprimé	J05AR10	Antiviraux à action directe	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association			RCP			Solution buvable	Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
LOPRAZOLAM 1 mg (Haviane)	Comprimé sécable	N05CD11	Hypnotiques et sédatifs	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Non	A prendre avant le coucher.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LORATADINE 10 mg (Clarityne)	Comprimé	R06AX13	Antihistaminiques à usage systémique	Autres antihistaminiques à usage systémique			Réponse laboratoire			Non		Bayer 19-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
LORAZEPAM 1 et 2,5 mg (Temesta)	Comprimé sécable	N05BA06	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Neuraxpharm 22-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LORMETAZEPAM 1 et 2 mg (Noctamide)	Comprimé sécable	N05CD06	Hypnotiques et sédatifs	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Non	A prendre avant le coucher.	Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais les études rapportent un écrasement possible.	4/18/2023
LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 50/12,5 ; 100/12,5 et 100/25 mg (Hyzaar, Fortzaar)	Comprimé	C09DA01	Antagonistes de l'angiotensine II en associations	Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques			RCP			Non	A prendre à heure fixe.	Organon 30-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
LOSARTAN 50 et 100 mg (Cozaar)	Comprimé	C09CA01	Antagonistes de l'angiotensine II non associés	Antagonistes de l'angiotensine II non associés			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe.		4/18/2023
LOXAPINE 25, 50 et 100 mg (Loxapac)	Comprimé	N05AH01	Antipsychotiques	Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines			RCP			Solution buvable	A prendre en une seule prise le soir ou à répartir au cours de la journée.	Laboratoires Eisai 11-03-2022 : ne pas écraser les comprimés	4/18/2023
MAGNESIUM / PYRIDOXINE 48/5 mg (Magne B6)	Comprimé	A12CC06	Autres compléments minéraux	Magnésium			Thériaque 03/2023			Solution buvable (Spasmag)			4/18/2023
MAGNESIUM 100 mg (Mag 2)	Comprimé	A12CC08	Autres compléments minéraux	Magnésium			Réponse laboratoire			Solution buvable, poudre pour solution buvable		Cooper 22-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
MANIDIPINE 10 et 20 mg (Iperfen)	Comprimé	C08CA11	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			RCP			Non	A prendre le matin après le petit-déjeuner. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
MAPROLINE 25 et 75 mg (Ludionil)	Comprimé ou comprimé sécable	N06AA21	Antidépresseurs	Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines		?				Non		En attente (Centre de Spécialités Pharmaceutiques)	4/18/2023
MARAVIROC 25, 75, 150 et 300 mg (Celsentrin)	Comprimé	J05AX09	Antiviraux à action directe	Autres antiviraux			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable	Eviter le jus de pamplemousse.	GSK 20-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
MEBEVERINE 100 et 200 mg (Duspatalin)	Gélule	A03AA04	Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux	Anticholinergiques synthétiques, esters d'amines tertiaires			Réponse laboratoire	Ouvrable selon HUG 03/2023		Non	A prendre avant les repas. La gélule assure une libération prolongée.	Viatris 17-02-2023 : L'ouverture des gélules est possible. Ne pas écraser les microgranules.	4/18/2023
MEBEVERINE 200 mg (génériques)	Comprimé	A03AA04	Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux	Anticholinergiques synthétiques, esters d'amines tertiaires			Réponse laboratoire			Non	A prendre avant les repas.	Zentiva 17-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
MEFLOQUINE 250 mg (Lariam)	Comprimé sécable	P01BC02	Antipaludéens	Alcaloïdes de la quinine			RCP			Non	Peut être écrasé et dissout dans l'eau pour administration immédiate. Goût amer. Eviter le jus de pamplemousse.	Chepharm 14-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
MEGESTROL 160 mg (Megace)	Comprimé	L02AB01	Hormones et apparentés	Progestatifs		?				Non	PA cytotoxique.	En attente (contacter Bausch Health Ireland Limited)	4/18/2023
MELATONINE 1mg gélule (préparation hospitalière)	Gélule	N05CH01	Psycholeptiques	Psycholeptiques			Réponse laboratoire			Solution buvable (préparation)	La mélatonine n'est pas hydrosoluble	Centre Lab 12-12-2023 : Les gélules peuvent être ouvertes pour récupérer la poudre. La mélatonine n'est pas hydrosoluble : mettre le contenu en suspension dans une compote ou yaourt brassé.	12/14/2023
MELOXICAM 7,5 et 15 mg (Mobic)	Comprimé ou comprimé sécable	M01AC06	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Oxicams			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas.	Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : Les comprimés se délitent facilement en bouche	4/18/2023
MELPHALAN 2 mg (Alkeran)	Comprimé	L01AA03	Alkylants	Analogues des moutardes azotées			Réponse laboratoire			Non	PA cytotoxique. A prendre de préférence 15-30 min avant les repas pour une absorption optimale.	ASPEN Pharma 22-02-2022 : non-écrasable car cytotoxique. Molécule instable en solution, à ne pas administrer avec de la nourriture.	4/18/2023
MEMANTINE 10 et 20 mg (Ebixa)	Comprimé ou comprimé sécable	N06DX01	Médicaments contre la démence	Autres médicaments contre la démence			Réponse laboratoire			Solution buvable	A prendre à heure fixe.	Lundbeck 14-03-2022 : Pas d'étude de stabilité mais écrasement et dissolution possible dans l'eau si administration immédiate. Goût amer.	4/18/2023
MEQUITAZINE 5 et 10 mg (Primalan)	Comprimé sécable	R06AD07	Antihistaminiques à usage systémique	Dérivés de la phénothiazine			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le soir (effet sédatif).	Pierre Fabre 21-02-2022 : risque d'oxydation si écrasement.	4/18/2023
MERCAPTOPURINE 50 mg (Purinethol)	Comprimé sécable	L01BB02	Antimétabolites	Analogues de la purine			Notice patient			Suspension buvable	PA cytotoxique. A prendre ≥ 1h avant ou ≥ 3h après l'ingestion d'aliments ou de lait.		4/18/2023
MESALAZINE 250, 400, 500, 800, 1000 et 1600 mg (Rowasa, Fivasa)	Comprimé GR	A07EC02	Anti-inflammatoires intestinaux	Acide aminosalicylique et dérivés			Thériaque 03/2023			Granulés, suppositoires (selon indication)	A prendre pendant les repas en cas de problèmes gastriques. Les suppositoires ou formes rectales n'ont pas forcément les mêmes indications que les formes orales.	En attente (Tillotts)	9/19/2023
MESNA 400 et 600 mg (Uromitexan)	Comprimé sécable	V03AF01	Tous autres médicaments	Médicaments détoxifiants dans un traitement cytotatique		?				Non		En attente (Baxter)	4/18/2023
METFORMINE 500, 700, 850 et 1000 mg (Glucophage, Stagid)	Comprimé ou comprimé sécable	A10BA02	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Biguanides			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés dispersibles			4/18/2023
METHADONE 1, 5, 20 et 40 mg (Zoryon, Méthadone AP-HP)	Gélule	N07BC02	Médicaments des troubles de l'addiction	Médicaments en cas de dépendance aux opiacés			Thériaque 03/2023			Sirap			6/30/2023
METHOTREXATE 2,5 mg (Novatrex)	Comprimé	L01BA01	Antimétabolites	Analogues de l'acide folique			Réponse laboratoire			Non	PA cytotoxique.	Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
METHYLDOPA 250 et 500 mg (Aldomet)	Comprimé	C02AB02	Antiadrénergiques agissant sur le système nerveux central	Méthyl dopa			Réponse laboratoire			Non		HAC Pharma 22-02-2022 : écrasement possible si besoin, avec administration immédiate et protection appropriée de l'opérateur	4/18/2023
METHYLPHENIDATE 10 mg (Ritaline)	Comprimé sécable	N06BA04	Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques	Sympathomimétiques d'action centrale			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence > 4h avant le coucher pour éviter les troubles d'endormissement.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
METHYLPHENIDATE LP 10, 20, 30 et 40 mg (Ritaline LP)	Gélule LP	N06BA04	Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques	Sympathomimétiques d'action centrale			RCP			Non	A prendre le matin. Peut être dispersé dans de la nourriture semi-solide froide (compote, yaourt) et avalé, suivi par la prise d'une boisson. Administration immédiate.		9/19/2023
METHYLPHENIDATE LP 18, 36 et 54 mg (Concerta LP)	Comprimé LP	N06BA04	Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques	Sympathomimétiques d'action centrale			RCP			Gélules LP ouvrables	A prendre le matin.		4/18/2023
METHYLPREDNISOLONE 4, 16 et 100 mg (Medrol)	Comprimé	H02AB04	Corticoïdes à usage systémique non associés	Glucocorticoïdes			Réponse laboratoire			Δ Adaptation posologique Δ Prednisolone orodispersible	A prendre pendant les repas.	Pfizer 04-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
METOCLOPRAMIDE 10 mg (Primperan)	Comprimé sécable	A03FA01	Propulsifs	Propulsifs			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Poudre pour solution buvable, suppositoires sécables		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
METOCLOPRAMIDE LP 15 mg (Prokinyl LP)	Gélule LP	A03FA01	Propulsifs	Propulsifs			Réponse laboratoire			Δ Non LP Δ Poudre pour solution buvable, suppositoires sécables		Laboratoires Techni-pharma 08-03-2022 : gélule non ouvrable	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
METOPIMAZINE 15 mg (Vogalene)	Géule	A04AD05	Antémétiques et anti-nauséux	Autres antiémétiques			RCP			Lyophilisat oral, solution buvable, suppositoires	A prendre de préférence 15 min avant les repas.		4/18/2023
METOPROLOL / FELODIPINE LP 47,5/5 mg (Logimax LP)	Comprimé LP	C07FB02	Bêta-bloquants, autres associations	Bêta-bloquants et inhibiteurs du canal de calcium			Galénique			Non	A prendre le matin à jeun ou après un repas léger.	Bouchara-Recordati 23-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
METOPROLOL 50 et 100 mg (Seloken)	Comprimé ou comprimé sécable	C07AB02	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants sélectifs			RCP			Non	A prendre pendant ou en fin de repas.	Bouchara-Recordati 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	9/19/2023
METOPROLOL LP 200 mg (Seloken)	Comprimé sécable LP	C07AB02	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants sélectifs			Notice patient			Non	A prendre pendant ou en fin de repas, de façon constante.		9/19/2023
METRONIDAZOLE / SPIRAMYCINE 125 mg/0,75 MUI et 250 mg/1,5 MUI (Rodogyl, Birodogyl)	Comprimé	J01RA04	Antibactériens en association	Antibactériens en associations			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	9/19/2023
METRONIDAZOLE 250 et 500 mg (Flagyl)	Comprimé	P01AB01	Médicaments contre l'amibiase et autres protozooses	Dérivés nitro-imidazolés			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
METYRAPONE 250 mg (Metopirone)	Capsule molle	V04CD01	Autres médicaments pour diagnostic	Test pour la fonction hypophysaire			Réponse laboratoire			Non	A prendre avec du lait ou après un repas pour minimiser les nausées et vomissements	HRA Pharma 28-03-2023 : pas d'étude donc écrasement déconseillé.	4/18/2023
MIANSERINE 10, 30 et 60 mg (génériques)	Comprimé ou comprimé sécable	N06AX03	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			RCP	Ecrasable selon laboratoire		Non		Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé car effet anesthésiant de la langue, mais possible en cas de besoin si administration immédiate (photosensible). Biogaran 29-01-2025 : écrasement impossible car pas d'étude	4/18/2023
MIDODRINE 2,5 mg (Gutron)	Comprimé	C01CA17	Cardiotoniques sauf les glycosides cardiotoniques	Adrénorécepteurs et dopaminergiques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable en gouttes (AAC)	A prendre de préférence le matin et au plus tard 4h avant le coucher.	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
MIFEPRISTONE 200 et 600 mg (Mifegyne)	Comprimé	G03XB01	Autres hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale	Antiprogestatifs			Réponse laboratoire			Non	Ne pas prendre avec du jus de pamplemousse	Nordic pharma 14-02-2022 : pas d'étude mais écrasement possible. Mauvais goût, très peu soluble dans l'eau, soluble en milieu acide. Peut être mélangé à un yaourt ou une compote.	4/18/2023
MILNACIPRAN 25 et 50 mg (Ixel)	Géule	N06AX17	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence pendant les repas.	Arrow 15-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude + goût amer.	4/18/2023
MINOCYCLINE 100 mg (Mynocine)	Géule	J01AA08	Tétracyclines	Tétracyclines			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas.	Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données	4/18/2023
MIRTAZAPINE 15 mg (Norset)	Comprimé ou comprimé sécable	N06AX11	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			RCP			Comprimés orodispersibles	A prendre de préférence le soir.		4/18/2023
MISOPROSTOL 25, 200 et 400 µg (Misopone)	Comprimé ou comprimé sécable	G02AD06	Médicaments pour l'ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Prostaglandines			Notice patient			Non			9/19/2023
MITOTANE 500 mg (Lysodren)	Comprimé sécable	L01XX23	Autres antinéoplasiques	Autres antinéoplasiques			RCP			Non	A prendre pendant des repas riches en graisses. PA cytotoxique : à manipuler avec des gants jetables.		4/18/2023
MOCLOBEMIDE 150 mg (Moclamine)	Comprimé sécable	N06AG02	Antidépresseurs	Inhibiteurs de la monoamine oxydase de type A (MAO-A)			Réponse laboratoire			Non	A prendre en fin de repas, en évitant les prises trop tardives.	Biocodex 25-02-2022 : écrasable si besoin mais goût amer. Peut être mélangé à une boisson ou un aliment, mais éviter ceux trop acides par précaution.	4/18/2023
MODAFINIL 100 mg (Modiodal)	Comprimé	N06BA07	Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques	Sympathomimétiques d'action centrale			Réponse laboratoire			Non		Teva 01-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
MOLSIDOMINE 2 et 4 mg (Corvasal)	Comprimé ou comprimé sécable	C01DX12	Vasodilatateurs utilisés dans les maladies cardiaques	Autres vasodilatateurs utilisés dans les maladies cardiaques			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre pendant les repas	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
MONTELUKAST 10 mg (Singulair)	Comprimé	R03DC03	Autres médicaments systémiques pour les syndromes obstructifs des voies respiratoires	Antagonistes des récepteurs des leucotriènes			Réponse laboratoire			Comprimés à croquer, granulés	A prendre le soir.	MSD 19-09-2020 : Le pelliculage masque le goût amer. Thermosensible et instable dans l'eau. Administration immédiate si écrasement.	4/18/2023
MORPHINE SULFATE 10 et 20 mg (Sevredol)	Comprimé sécable	N02AA01	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable, gélules ouvrables	Risque d'effets indésirables graves avec les comprimés écrasés.	Mundipharma 03-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
MORPHINE SULFATE 5, 10, 20 et 30 mg (Actiskenan)	Géule	N02AA01	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			RCP			Solution buvable	Peut être dispersé dans un aliment semi-solide (compote, yaourt...). Administration immédiate.	Mundipharma 03-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
MORPHINE SULFATE LP 10, 30, 60, 100 et 200 mg (Moscontin LP)	Comprimé LP	N02AA01	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			RCP			Gélules LP ouvrables	Risque d'effets indésirables graves avec les comprimés écrasés.		4/18/2023
MORPHINE SULFATE LP 10, 30, 60, 100 et 200 mg (Skenan LP)	Géule LP	N02AA01	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			RCP			Pas d'équivalent LP	Peut être dispersé dans un aliment semi-solide (compote, yaourt...). Administration immédiate.		4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
MOXIFLOXACINE 400 mg (Izilox)	Comprimé	J01MA14	Quinolones antibactériennes	Fluoroquinolones			Thériaque 03/2023	Ecrasable selon laboratoire		Non	A prendre à heure fixe.	Bayer 21-02-2022 : écrasement possible mais goût amer, peut être mélangé à des aliments semi-liquides	4/18/2023
MOXONIDINE 0,2 et 0,4 mg (Physiotens)	Comprimé	C02AC05	Antiadrénergiques agissant sur le système nerveux central	Agonistes des récepteurs de l'imidazoline			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence à heure fixe.	Viatrix 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
MYCOPHENOLATE 180 et 360 mg (Myfortic)	Comprimé GR	L04AA06	Immunosuppresseurs	Immunosuppresseurs sélectifs			RCP			Non	PA tératogène.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
MYCOPHENOLATE 250 mg (Cellcept)	Géule	L04AA06	Immunosuppresseurs	Immunosuppresseurs sélectifs			RCP			Non	PA tératogène.		4/18/2023
MYCOPHENOLATE 500 mg (Cellcept)	Comprimé	L04AA06	Immunosuppresseurs	Immunosuppresseurs sélectifs			RCP			Non	PA tératogène.		4/18/2023
NABUMETONE 500 mg (Nabucox)	Comprimé	M01AX01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Autres anti-inflammatoires antirhumatismaux non stéroïdiens			RCP			Comprimés dispersibles			4/18/2023
NADOLOL 80 mg (Corgard)	Comprimé sécable	C07AA12	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants non sélectifs			Notice patient			Non	A prendre de préférence le matin.	Cheplapharm 14-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
NAFTIDROFURYL 200 mg (Naftilux)	Géule	C04AX21	Vasodilatateurs périphériques	Autres vasodilatateurs périphériques			RCP			Non	A prendre pendant les repas. PA irritant.	Therabel 25-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
NALMÉnidine 200 µg (Rizmoic)	Comprimé	A06AH05	Médicaments de la constipation	Antagonistes des récepteurs opioïdes périphériques			Réponse laboratoire			Non	Pas de données concernant le changement de biodisponibilité lors d'un passage par sonde nasogastrique, ni par sonde gastro-jéjunostomie permettant la recommandation d'un écrasement possible par le labo.	Viatrix 16-06-2025 : écrasement déconseillé car pas d'étude	6/23/2025
NALOXEGOL 12,5 et 25 mg (Moxventig)	Comprimé	A06AH03	Laxatifs	Antagonistes du récepteur opioïde périphérique			RCP			Non	A prendre en dehors des repas, de préférence le matin. Peut être écrasé et mélangé dans ½ verre d'eau, à boire immédiatement. Rincer ensuite le verre avec ½ volume d'eau et le boire immédiatement.		7/20/2023
NALTREXONE 50 mg (Revia)	Comprimé sécable	N07BB04	Médicaments des troubles de l'addiction	Médicaments utilisés en cas de dépendance à l'alcool			Réponse laboratoire			Non		Accord Healthcare 15-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
NAPROXÈNE 550 mg (Antalnox)	Comprimé sécable	M01AE02	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide propionique			RCP			Non	A prendre pendant les repas.	Pierre Fabre 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	9/19/2023
NARATRIPTAN 2,5 mg (Naramig)	Comprimé	N02CC02	Antimigraigneux	Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1			RCP			Non	A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible.	GSK 15-02-2022 : cf RCP	4/18/2023
NEBIVOLOL 5 mg (Temerit)	Comprimé sécable	C07AB12	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants sélectifs			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Menarini 14-02-2022 : non-écrasable car pas d'étude.	4/18/2023
NEFOPAM 30mg (générique)	Comprimé	N02BG06	Autres analgésiques et antipyrétiques	Autres analgésiques et antipyrétiques			RCP			Non		Panpharma 18-06-2024 : écrasement déconseillé car pas d'étude	6/24/2024
NEVIRAPINE 200 mg (Viramune)	Comprimé	J05AG01	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable		Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
NEVIRAPINE LP 100 et 400 mg (génériques)	Comprimé LP	J05AG01	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique			RCP			Δ Non LP Δ Suspension buvable			4/18/2023
NICARDIPINE 20 mg (Loxen)	Comprimé sécable	C08CA04	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			Notice patient			Non	A prendre avant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données	4/18/2023
NICARDIPINE LP 50 mg (Loxen LP)	Géule LP	C08CA04	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			RCP			Non	A prendre avant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données	4/18/2023
NICORANDIL 10 et 20 mg (Ikorel)	Comprimé ou comprimé sécable	C01DX16	Vasodilatateurs utilisés dans les maladies cardiaques	Autres vasodilatateurs utilisés dans les maladies cardiaques			Réponse laboratoire			Non	Administration immédiate.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
NICOTINAMIDE 500 mg (Nicobion)	Comprimé	A11HA01	Autres préparations à base de vitamines seules	Autres préparations à base de vitamines seules			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Teofarma 08-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Photosensible.	4/18/2023
NIFÉDIPINE LP 20 et 30 mg (génériques)	Comprimé LP	C08CA05	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			RCP			Non	Eviter le jus de pamplemousse.	En attente (génériques)	4/18/2023
NILOTINIB 50, 150 et 200 mg (Tasigna)	Géule	L01XE08	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP			Non	A prendre ≥ 2h après et ≥ 1h avant les repas. La géule peut être vidée dans une cuillère à café de compote de pomme uniquement, pour administration immédiate. Eviter le jus de pamplemousse.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
NILUTAMIDE 50 et 150 (Anandron)	Comprimé	L02BB02	Antihormones et apparentés	Anti-androgènes			Réponse laboratoire			Non		Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
NIMODIPINE 30 mg (Nimotop)	Comprimé	C08CA06	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	Eviter le jus de pamplemousse.	Bayer 21-02-2022 : écrasement déconseillé car photosensible.	4/18/2023
NINTEDANIB 100 et 150 mg (Ofev)	Capsule molle	L01XE31	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP			Non	A prendre à heure fixe pendant les repas.	Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
NIRMATRELVIR / RITONAVIR 150/100 mg (Paxlovid)	Comprimé	J05AE30	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de protéase			RCP			Non			6/30/2023
NITRAZEPAM 5 mg (Mogadon)	Comprimé sécable	N05CD02	Hypnotiques et sédatifs	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Non	A prendre avant le coucher.	Viatris 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
NITRENDIPINE 10 et 20 mg (génériques)	Comprimé	C08CA08	Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires	Dérivés de la dihydropyridine			RCP			Non	A prendre en fin de repas. Eviter le jus de pamplemousse.	En attente (génériques)	4/18/2023
NITROFURANTOINE 50 mg (Furadantine)	Gélule	J01XE01	Autres antibactériens	Dérivés du nitrofurane			Réponse laboratoire			Solution buvable (AAC)	A prendre de préférence pendant les repas.	Teva 01-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
NOMEGESTROL 5 mg (Lutenyl)	Comprimé sécable	G03DB04	Progestatifs	Dérivés pregnadiène			Réponse laboratoire			Non		Theramex 17-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
NORETHANDROLONE 10 mg (Nilevar)	Comprimé sécable	A14AA09	Stéroïdes anabolisants	Dérivés de l'androstane			Notice patient			Non			4/18/2023
NORFLOXACINE 400 mg (génériques)	Comprimé	J01MA06	Quinolones antibactériennes	Fluoroquinolones			Réponse laboratoire			Non	Ne pas prendre avec un produit laitier.	Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
OFLOXACINE 200 mg (Monoflocet, Oflocet)	Comprimé sécable	J01MA01	Quinolones antibactériennes	Fluoroquinolones			Réponse laboratoire			Non	Ne pas prendre de fer, d'antiacides ou de sucralfate 2h après la prise.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
OLANZAPINE 5, 7,5 et 10 mg (Zyprexa)	Comprimé	N05AH03	Antipsychotiques	Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés orodispersibles	A prendre à heure fixe. PA irritant.	Lilly 06-08-2020 : écrasement déconseillé car comprimé sensible à la lumière et à l'oxydation, et risque de majoration des EI	4/18/2023
OLAPARIB 100, 150 mg (Lynparza)	Comprimé	L01XK01	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de poly (ADP-RIBOSE) polymérase (PARP)			Réponse laboratoire			Non	Eviter le jus de pamplemousse.	AstraZeneca 13-05-2022 : cf. RCP	4/18/2023
OLMESARTAN 10, 20 et 40 mg (Olimtec)	Comprimé	C09CA08	Antagonistes de l'angiotensine II non associés	Antagonistes de l'angiotensine II non associés			RCP			Non	A prendre à heure fixe.		9/19/2023
OMEPRAZOLE 10 et 20 mg (Mopral)	Gélule GR	A02B0C1	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Inhibiteurs de la pompe à protons			RCP			Comprimés GR	Les gélules peuvent être vidées dans de l'eau plate, un jus ou une compote. Administration immédiate (< 30 min).	Cheplapharm 14-03-2022 : cf. RCP	9/19/2023
OMEPRAZOLE 20 mg (Mopralpro)	Comprimé GR	A02B0C1	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Inhibiteurs de la pompe à protons			RCP			Gélules ouvrables	Peut être dissout sans l'écraser dans de l'eau plate, un jus ou une compote. Administration immédiate (< 30 min).		4/18/2023
ONDANSETRON 4 et 8 mg (Zophren)	Comprimé	A04AA01	Antémétiques et anti-nauséux	Antagonistes de la sérotonine (5-HT3)			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés orodispersibles, sirop, suppositoire		Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
ORNIDAZOLE 500 (Tiberol)	Comprimé	P01AB03	Autres antibactériens	Dérivés de l'imidazole			Réponse laboratoire			Non		Serb 22-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude + photosensible.	4/18/2023
OSELTAMIVIR 30, 45 et 75 mg (Tamiflu, Eblitumin)	Gélule	J05AH02	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la neuraminidase			RCP			Poudre pour suspension buvable	A mélanger à un liquide sucré (eau sucrée, chocolat liquide, sirop, coulis) pour masquer le goût. Administration immédiate.		4/18/2023
OXAZEPAM 10 et 50 mg (Seresta)	Comprimé ou comprimé sécable	N05BA04	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Neuraxpharm 22-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
OXCARBAZEPINE 150, 300 et 600 mg (Trileptal)	Comprimé sécable	N03AF02	Antiépileptiques	Dérivés du carboxamide			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable	A prendre à heure fixe sauf mention contraire. Peut être cassé en deux pour être avalé plus facilement.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
OXETORONE 60 mg (Nocertone)	Comprimé sécable	N02CX06	Antimigraineux	Autres antimigraineux			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence avant les repas du soir et au coucher.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
OXYBUTYRINE 5 mg (Ditropan)	Comprimé sécable	G04BD04	Autres médicaments urologiques, antispasmodiques inclus	Antispasmodiques urinaires			Réponse laboratoire			Sirop (AAC)	A prendre à jeun, ou si douleurs gastriques pendant les repas ou avec du lait.	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Mauvais goût.	4/18/2023
OXYCODONE 5, 10 et 20 mg (Oxynorm)	Gélule	N02AA05	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			Réponse laboratoire			Comprimés orodispersibles, solution buvable	Eviter le jus de pamplemousse.	Mundipharma 24-04-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/24/2023
OXYCODONE LP 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 et 120 mg (Oxycotin LP)	Comprimé LP	N02AA05	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			RCP			Δ Non LP Δ Comprimés orodispersibles, solution buvable	Risque de surdosage si écrasement. Eviter le jus de pamplemousse.	Mundipharma 03-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
PANCREATINE 10, 12,5 ; 25 et 40 kU (Creon)	Gélule GR	A09AA02	Digestifs, y compris les enzymes	Enzymes			RCP			Granulés GR	Peut être vidé dans un aliment acide semi-solide (compote, yaourt) ou liquide (jus de fruit, lait). Administration immédiate. Ne pas croquer ni garder en bouche le mélange.		9/19/2023
PANTOPRAZOLE 20 et 40 mg (Eupantol, Inipomp)	Comprimé GR	A02BC02	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Inhibiteurs de la pompe à protons			RCP			Non	A prendre 1h avant les repas.		9/19/2023
PARACETAMOL / CODEINE 300/25, 400/20, 400/25, 500/30 et 600/50 mg (Codoliprane, Dafalgan codeine, Klipal codeine, Lindiane)	Comprimé sécable	N02BE51	Autres analgésiques et antipyrétiques	Anilides			RCP			Comprimés effervescents		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
PARACETAMOL / CODEINE 500/30 mg (Codoliprane)	Gélule	N02BE51	Opioides	Alcaloïdes naturels de l'opium			RCP			Comprimés effervescents			4/18/2023
PARACETAMOL / OPIUM ± CAFEINE 300/10/30 et 500/25 mg (Lamalaine, IZALGI)	Gélule	N02BE51	Autres analgésiques et antipyrétiques	Anilides			RCP			Suppositoires			4/18/2023
DIPHENHYDRAMINE 500/60/25 mg (Actied rhume jour & nuit) PARACETAMOL / PSEUDOEPHEDRINE I	Comprimé	R01BA52	Décongestionnants nasaux à usage systémique	Sympathomimétiques			Notice patient			Non			4/18/2023
PARACETAMOL / TRAMADOL 37,5/325 mg (Kprim)	Comprimé	N02AJ13	Opioides	Autres opioides			RCP			Comprimés effervescents			4/18/2023
PARACETAMOL 500 et 1000 mg (Dafalgan, Doliprane)	Gélule	N02BE01	Autres analgésiques et antipyrétiques	Anilides			Réponse laboratoire			Comprimés effervescents, suppositoires		UPSA 30-01-2025 : pas d'opposition galénique mais pas d'étude de bioéquivalence entre l'administration de la gélule entière et son contenu.	1/31/2025
PARACETAMOL 500 et 1000 mg (Dafalgan, Doliprane)	Comprimé	N02BE01	Autres analgésiques et antipyrétiques	Anilides			Réponse laboratoire	Dafalgan : Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés effervescents, suppositoires		UPSA 30-01-2025 : pas d'opposition galénique mais pas d'étude de bioéquivalence entre l'administration du comprimé entier et son contenu.	1/31/2025
PAROXETINE 20 mg (Deroxat)	Comprimé sécable	N06AB05	Antidépresseurs	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre le matin pendant les repas pour réduire le risque de nausées.	GSK 02-10-2020 : écrasement déconseillé car pas de données. Mauvais goût et photosensible.	6/30/2023
PAZOPANIB 200 et 400 mg (Votrient)	Comprimé	L01EX03	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP			Solution buvable (AAC)	A prendre ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
PENICILLAMINE 300 mg (Trolovol)	Comprimé	M01CC01	Antirhumatismaux spécifiques	Pénicillamine et analogues			Réponse laboratoire			Non	A prendre 1h avant les repas chez l'enfant dans certaines indications (cf. RCP).	Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données. Comprimé non-sécable malgré la barrette de cassure.	4/18/2023
PENTOXIFYLLINE LP 400 mg (génériques)	Comprimé LP	C04AD03	Vasodilatateurs périphériques	Dérivés de la purine			RCP			Non	A prendre de préférence pendant les repas.	En attente (génériques)	4/18/2023
PERAMPANEL 2, 4, 6, 8, 10 et 12 mg (Fycempa)	Comprimé	N03AX22	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable	A prendre au coucher.		4/18/2023
PERINDOPRIL / INDAPAMIDE 2,5/0,625 ; 4/1,25 ; 5/1,25 ; 8/2,5 et 10/2,5 (Preterax, Bipreterax)	Comprimé	C09BA04	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre avant les repas, de préférence le matin.	Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
PERINDOPRIL 2,5 ; 5 et 10 mg (Coversyl)	Comprimé	C09AA04	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre avant les repas, de préférence le matin.	Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
PHENOBARBITAL 10, 50 et 100 mg (Gardenal)	Comprimé	N03AA02	Antiépileptiques	Barbituriques et dérivés			RCP			Non	A prendre le soir au coucher. Peut être écrasé et mélangé à l'alimentation.		4/18/2023
PHENOBARBITAL 15, 50, 100 et 150 mg (Alepsal)	Comprimé	N03AA02	Antiépileptiques	Barbituriques et dérivés			RCP			Non	A prendre le soir au coucher. Peut être écrasé et mélangé à l'alimentation.		9/19/2023
PHENOXYMETHYLPENICILLINE 1 M UI (Oraciline)	Comprimé sécable	J01CE02	Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines	Pénicillines sensibles aux bêta-lactamases			Réponse laboratoire			Suspension buvable		UCB Pharma 24-02-2022 : écrasement et mélange possible dans un liquide sucré ou de la compote. Administration immédiate.	4/18/2023
PHENYLBUTYRATE 500 mg (Anmonaps)	Comprimé	A16AX03	Autres produits pour les voies digestives et le métabolisme	Produits divers pour le tube digestif et le métabolisme			Réponse laboratoire			Granulés, liquide oral	A prendre pendant les repas.	Immedica 16-02-2022 : non écrasable car pas de données. Mauvais goût. Privilégier les alternatives.	4/18/2023
PHENYTOÏNE 100 mg (Di-hydan)	Comprimé sécable	N03AB02	Antiépileptiques	Hydantoïne et dérivés			RCP			Suspension buvable (AAC)	A prendre de préférence 1h avant les repas avec ½ verre d'eau, ou en cas d'irritation gastrique pendant les repas.		4/18/2023
PHENYTOÏNE 100 mg (Diphante)	Comprimé sécable	N03AB02	Antiépileptiques	Hydantoïne et dérivés			RCP			Suspension buvable (AAC)	A prendre de préférence 1h avant les repas avec ½ verre d'eau, ou en cas d'irritation gastrique pendant les repas.		4/18/2023
PHLOROGLUCINOL / SIMETICONE 80/125 mg (Meteoxane)	Gélule	A03AX	Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux	Autres médicaments en cas de troubles fonctionnels du côlon			Réponse laboratoire			Comprimés orodispersibles (Δ, Phloroglucinol seul)	A prendre avant les repas ou au moment des douleurs.	Alfasigma 08-04-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude.	4/18/2023
PHLOROGLUCINOL 80 mg (Spasfon)	Comprimé	A03AX12	Médicaments contre les désordres fonctionnels gastro-intestinaux	Autres médicaments contre les désordres fonctionnels gastro-intestinaux			Réponse laboratoire			Comprimés orodispersibles, suppositoires		Teva 01-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
PIMOZIDE 1 et 4 mg (Orap)	Comprimé ou comprimé sécable	N05AG02	Antipsychotiques	Dérivés de la diphénylbutylpipéridine			Notice patient			Non	A prendre le soir. Eviter le jus de pamplemousse.	Eumédica 02-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
PINAVERIUM 50 et 100 mg (Dicetel)	Comprimé	A03AX04	Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux	Autres médicaments en cas de troubles fonctionnels du côlon			RCP			Non	PA irritant pour l'œsophage. Les comprimés doivent être ingérés sans les croquer, ni les sucer, avec un grand verre d'eau au milieu des repas. Ne pas prendre en étant allongé ou avant le coucher.	Viatrix 17-02-2023 : Ne pas écraser les comprimés sauf si administration par sonde gastrique.	4/18/2023
PINDOLOL 5 et 15 mg (Visken, Visken Quinze)	Comprimé	C07AA03	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants non sélectifs			Notice patient			Non		En attente (Centre de Spécialités Pharmaceutiques)	9/19/2023
PIPAMPERONE 40 mg (Dipiperon)	Comprimé sécable	N05AD05	Antipsychotiques	Dérivés de la butyrophénone			Thériaque 03/2023	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable	A prendre de préférence au dîner ou au coucher.		4/18/2023
PIRACETAM 400 et 800 mg (génériques)	Comprimé ou comprimé sécable	N06BX03	Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques	Autres psychostimulants et nootropiques			Notice patient			Solution buvable		Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
PIRETANIDE 6 mg (Eurelix)	Gélule GR	C03CA03	Diurétiques de l'anse	Sulfamides non associés			RCP			Non	A prendre de préférence après les repas le matin ou en milieu de journée	Sanofi 29/05/2024 : ouverture déconseillée car pas d'étude. Ne pas écraser les microgranules afin de conserver leur propriété gastro-résistante.	6/3/2024
PIRIBEDIL LP 50 mg (Trivastal LP)	Comprimé LP	N04BC08	Dopaminergiques	Agonistes dopaminergiques			Notice patient			Non	A prendre en fin de repas.		4/18/2023
PIROXICAM 10 et 20 mg (Feldene)	Gélule	M01AC01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Oxicams			RCP			Comprimés effervescents, comprimés dispersibles	PA irritant. A prendre pendant les repas.		4/18/2023
PIROXICAM 20 mg (Brexin)	Comprimé sécable	M01AC01	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Oxicams			RCP			Comprimés effervescents, comprimés dispersibles	PA irritant. A prendre pendant les repas.		9/19/2023
PIVMECILLINAM 200 mg (Selexid)	Comprimé	J01CA08	Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines	Pénicillines à large spectre			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas, en position debout ou assise et ne pas s'allonger ≥ 30 min après la prise pour limiter le risque d'ulcération de l'œsophage.	Aloga 21-04-2022 : écrasement possible mais médicament amer	4/18/2023
PIZOTIFENE 0,5 mg (Sanmigran)	Comprimé	N02CX01	Antimigraineux	Autres antimigraineux			Réponse laboratoire			Non		En attente (Centre de Spécialités Pharmaceutiques)	4/18/2023
POMALIDOMIDE 1, 2, 3, 4 mg (Imnovid)	Gélule	L04AX06	Immunosuppresseurs	Autres immunosuppresseurs			RCP			Non	PA cytotoxique et tératogène. A prendre à heure fixe.	Bristol Myers Squibb 28-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
PONATINIB 15, 30 et 45 mg (Iclusig)	Comprimé	L01EA05	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			RCP			Non			4/18/2023
POSACONAZOLE 100 mg (Noxafil)	Comprimé GR	J02AC04	Antimycosiques à usage systémique	Dérivés triazolés			RCP			Suspension buvable Δ Adaptation posologique Δ	Non-interchangeabilité entre la suspension buvable et les comprimés : suivre leurs recommandations posologiques respectives.		4/18/2023
POTASSIUM CHLORURE 600 mg (Diffu K)	Gélule	A12BA01	Potassium	Potassium			Réponse laboratoire			Sirop		UCB Pharma 24-02-2022 : gélules ouvrables si besoin, ne pas mâcher les microgranules (risque d'ulcération de l'estomac du fait de la libération de cristaux de chlorure de potassium).	4/18/2023
POTASSIUM CHLORURE LP 600 et 1000 mg (Kaleorid LP)	Comprimé LP	A12BA01	Potassium	Potassium			RCP			Sirop	A prendre de préférence en fin de repas.		4/18/2023
PRAMIPEXOLE 0,18 et 0,7 mg (Sifrol)	Comprimé sécable	N04BC05	Dopaminergiques	Agonistes dopaminergiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas.	Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : photosensible, cf. RCP	4/18/2023
PRAMIPEXOLE LP 0,26 ; 0,52 ; 1,05 et 2,1 mg (Sifrol LP)	Comprimé LP	N04BC05	Dopaminergiques	Agonistes dopaminergiques			RCP			Non	A prendre à heure fixe.	Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : photosensible, cf. RCP	4/18/2023
PRASUGREL 10 mg (Effient)	Comprimé	B01AC22	Antithrombotiques	Inhibiteur de l'agregation plaquettaire			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Substipharm 26/01/2023 : cf. RCP + gout amer	4/18/2023
PRAVASTATINE 10, 20 et 40 mg (Vasten)	Comprimé sécable	C10AA03	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le soir.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
PRAZEPAM 10 et 40 mg (Lysanxia)	Comprimé ou comprimé sécable	N05BA11	Anxiolytiques	Dérivés des benzodiazépines			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes		Afasigma 08-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
PRAZIQUANTEL 600 mg (Biltricide)	Comprimé sécable	P02BA01	Antitrimatodes	Dérivés de la quinoléine et apparentés			RCP			Non	Peut être écrasé ou désagrégé et mélangé à un liquide ou un aliment semi-solide. A prendre de préférence pendant ou en fin de repas, le soir en cas de prise unique.		4/18/2023
PRAZOSINE LP 2,5 et 5 mg (Alpress LP)	Comprimé osmotique	C02CA01	Antiagrégneriques agissant en périphérie	Alpha-bloquants			RCP			Non			4/18/2023
PREDNISONE 1, 5 et 20 mg (Cortacyl)	Comprimé ou comprimé sécable	H02AB07	Corticoides à usage systémique non associés	Glucocorticoides			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Δ Adaptation posologique Δ Prednisolone orodispersible	A prendre de préférence au cours des repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou défilé	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
PREGABALINE 25, 50, 75, 100, 150, 200 et 300 (Lyrica)	Gélule	N03AX16	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			Réponse laboratoire			Solution buvable		Pfizer 04-08-2020 : ouverture déconseillée, mais une étude prouve la bioeq des gélules ouvertes. Mélange à de l'eau, jus de fruits ou nourriture semi-solide à la discrétion du clinicien.	4/18/2023
PRIMIDONE 250 mg (Mysoline)	Comprimé sécable	N03AA03	Antiépileptiques	Barbituriques et dérivés			RCP			Non	A prendre à heure fixe.		4/18/2023
PRISTINAMYCINE 250 et 500 mg (Pyostacine)	Comprimé sécable	J01FG01	Macrolides, lincosamides et streptogramines	Streptogramines			RCP			Non	Peut être écrasé dans un peu de lait ou un aliment sucré (confiture). A prendre pendant les repas.	Sanofi 23-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
PROBENECIDE 500 mg (Santuril)	Comprimé sécable	M04AB01	Médicaments contre la goutte	Uricosuriques			RCP			Non	A prendre pendant les repas.		4/18/2023
PROCARBAZINE 50 mg (Natulan)	Gélule	L01XB01	Autres antinéoplasiques	Méthylhydrazines			RCP			Non	PA cytotoxique. Boire abondamment pendant la prise.		4/18/2023
PROGESTERONE 100 et 200 mg (Utrogestan)	Capsule molle	G03DA04	Progestatifs	Dérivés pregnadiène			Galénique			Non	A prendre à distance des repas, de préférence le soir au coucher. Peut être également administré par voie vaginale.		4/18/2023
PROMETHAZINE 25 mg (Phenergan)	Comprimé	R06AD02	Antihistaminiques à usage systémique	Dérivés de la phénothiazine			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence le soir (effet sédatif).	DB Pharma 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
PROPAFENONE 300 mg (Rythmol)	Comprimé sécable	C01BC03	Antiarythmiques de classe I et III	Antiarythmiques, classe Ic			Notice patient	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre après les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Viatrix 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
PROPERICIAZINE 10 mg (Neuleptil)	Gélule	N05AC01	Antipsychotiques	Phénothiazines de structure pipéridinique			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
PROPRANOLOL 40 mg (génériques)	Comprimé sécable	C07AA05	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants non sélectifs			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution buvable		Biogaran 19-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'études	4/18/2023
PROPRANOLOL LP 80 et 160 mg (génériques)	Gélule LP	C07AA05	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants non sélectifs			Réponse laboratoire	Ouvrable selon HUG 03/2023		△ Non LP △ Solution buvable	A prendre de préférence le matin.	Teva 01-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
PROPYLTHIOURACILE 50 mg (Propylax)	Comprimé	H03BA02	Antithyroïdiens	Thiouraciles			Réponse laboratoire			Non		HAC Pharma 22-02-2022 : écrasement possible si besoin, avec administration immédiate et protection appropriée de l'opérateur	4/18/2023
PYRAZINAMIDE 500 mg (Pirilene)	Comprimé sécable	J04AK01	Antituberculeux	Autres antituberculeux			Thériaque 03/2023	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
PYRIDOSTIGMINE 60 mg (Mestinon)	Comprimé	N07AA02	Parasympathomimétiques	Anticholinestérasiques			Réponse laboratoire	Ouvrable selon HUG 03/2023		Sirop (AAC)		Viatrix 17-02-2023 : nous ne pouvons vous garantir la bonne stabilité ou biodisponibilité du médicament écrasable.	4/18/2023
PYRIDOSTIGMINE LP 180 mg (Mestinon LP)	Comprimé LP	N07AA02	Parasympathomimétiques	Anticholinestérasiques			Thériaque 03/2023			△ Non LP △ Sirop (AAC)	A ne pas prendre en position couchée.		4/18/2023
PYRIDOXINE / THIAMINE 35/250 et 50/250 mg (Vitamine B1 B6, Princi B)	Comprimé	A11DB	Vitamine B1 associée ou non avec les vitamines B6 et/ou B12	Vitamine B1 en association avec les vitamines B6 et/ou B12			?			Non		En attente (SERP)	4/18/2023
PYRIDOXINE 250 mg (Becilan)	Comprimé sécable	A11HA02	Autres préparations à base de vitamines seules	Autres préparations à base de vitamines seules			Réponse laboratoire			Non		DB Pharma 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
PYRIMETHAMINE 50 mg (Malocide)	Comprimé	P01BD01	Antipaludéens	Diaminopyrimidines			Réponse laboratoire			Non		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
QUETIAPINE LP 50, 300 et 400mg (Xeroquel)	Comprimé LP	N05AH04	Antipsychotiques	diazépines, oxazépines et thiazépines			RCP			Non		RCP : "Les comprimés doivent être avalés entiers et ne doivent pas être divisés, mâchés ou écrasés"	3/28/2024
QUINAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 20/12,5 mg (Aculix)	Comprimé sécable	C09BA06	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques			Réponse laboratoire					Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
QUINAPRIL 5 et 20 mg (Acuitel)	Comprimé sécable	C09AA06	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association			Réponse laboratoire			Non		Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
QUININE / QUINIDINE / CINCHONINE / CINCHONIDINE 125 et 500 mg (Quinimax)	Comprimé sécable	P01BC01	Antipaludéens	Alcaloïdes de la quinine			Réponse laboratoire			Non	Eviter le jus de pamplemousse.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
RABEPRAZOLE 10 et 20 mg (Pariet)	Comprimé GR	A02BC04	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Inhibiteurs de la pompe à protons			RCP			Non	A prendre le matin avant les repas (uniquement pour favoriser l'observance : ni l'heure de prise ni l'alimentation n'a d'influence sur l'activité du Rabéprazole)	Janssen 09-03-2022 : non écrasable car PA instable en milieu acide.	4/18/2023
RACECADOTRIL 100 mg (Tiorfan, Diarfix, Tiorfast)	Gélule	A07XA04	Autres anti diarrhéiques	Autres anti diarrhéiques			?			Poudre orale, suspension buvable		En attente (Bioprojet Pharma)	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
RACECADOTRIL 175 mg (Tiorfanor)	Comprimé	A07XA04	Autres anti diarrhéiques	Autres anti diarrhéiques		?				Poudre orale, suspension buvable		En attente (Bioprojet Pharma)	4/18/2023
RALTEGRAVIR 400 et 600 mg (Isentress)	Comprimé	J05AJ01	Antiviraux à action directe	Inhibiteur de l'intégrase			RCP			Comprimés à croquer, granulés pour suspension buvable	Non-interchangeabilité entre les comprimés, comprimés à croquer et granulés : suivre leurs recommandations posologiques respectives.		4/18/2023
RAMPRIIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 5/12,5 mg (Cotriatec)	Comprimé	C09BA05	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques			RCP			Non	A prendre à heure fixe, de préférence le matin.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
RAMIPRIL 1,25 ; 2, 5 et 10 mg (Triatec)	Comprimé ou comprimé sécable	C09AA05	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
REPAGLINIDE 0,5 ; 1 et 2 mg (Novonorm)	Comprimé	A10BX02	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Autres médicaments hypoglycémiantes autres que les insulines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre moins de 30 min avant les repas.	Novo Nordisk 01-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
RIFABUTINE 150 mg (Ansapiline)	Géule	J04AB04	Antituberculeux	Antibiotiques			Notice patient	Ouvrable selon laboratoire		Non		Serb 22-03-2022 : peut être ouvert et mélangé à de la compote de pommes.	4/18/2023
RIFAMPICINE 300 mg (Rifadine)	Géule	J04AB02	Antituberculeux	Antibiotiques			Réponse laboratoire			Suspension buvable	A prendre de préférence ≥ 30 min avant les repas.	Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	9/19/2023
RILMENIDINE 1 mg (Hyperium)	Comprimé	C02AC06	Antiadrénergiques agissant sur le système nerveux central	Agonistes des récepteurs de l'imidazoline			Réponse laboratoire			Non	A prendre le matin.	Servier 28-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
RILPIVRINE 25 mg (Edurant)	Comprimé	J05AG05	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique			RCP			Non	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Janssen 09-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
RILUZOLE 50 mg (Rilutek)	Comprimé	N07XX02	Autres médicaments du système nerveux	Autres médicaments du système nerveux			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable	A prendre à heure fixe.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
RISPERIDONE 1, 2 et 4 mg (Risperdal)	Comprimé sécable	N05AX08	Antipsychotiques	Autres antipsychotiques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés orodispersibles, solution buvable		Janssen 12-04-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
RITONAVIR 100 mg (Norvir)	Comprimé	J05AE03	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de protéase			RCP			Suspension buvable	A prendre pendant les repas.		4/18/2023
RIVAROXABAN 10, 15 et 20 mg (Xarelto)	Comprimé	B01AF01	Antithrombotiques	Inhibiteurs directs du facteur Xa			RCP			Granulés pour suspension buvable (AAP)	Peut être écrasé et mélangé à de l'eau ou de la compote de pommes. Administration immédiate.		4/18/2023
RIVASTIGMINE 1,5 ; 3, 4,5 et 6 mg (Exelon)	Géule	N06DA03	Médicaments contre la démence	Anticholinestérasiques			RCP			Solution buvable, dispositif transdermique	A prendre pendant les repas.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
RIZATRIPTAN 5 et 10 mg (Maxalt)	Comprimé	N02CC04	Antimigraineux	Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1		?				Comprimés orodispersibles	A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible.	En attente (Organon)	4/18/2023
ROPINIROLE 0,25 ; 0,5 ; 1, 2 et 5 mg (Requip)	Comprimé	N04BC04	Dopaminergiques	Agonistes dopaminergiques			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre de préférence pendant les repas.	GSK 07-10-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Photosensible et hydrosoluble.	4/18/2023
ROPINIROLE LP 2, 4 et 8 mg (Requip LP)	Comprimé LP	N04BC04	Dopaminergiques	Agonistes dopaminergiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre à heure fixe.	GSK 10-07-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Photosensible et hydrosoluble.	4/18/2023
ROSUVASTATINE 5, 10 et 20 mg (Crestor)	Comprimé	C10AA07	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)			Notice patient			Non	A prendre de préférence à heure fixe.		4/18/2023
ROXITHROMYCINE 100 et 150 mg (Rulid)	Comprimé	J01FA06	Macrolides, lincosamides et streptogramines	Macrolides			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimés pour suspension buvable (50 mg)	A prendre de préférence avant les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
RUFINAMIDE 100, 200 et 400 mg (Novelon)	Comprimé	N03AF03	Antiépileptiques	Dérivés du carboxamide			RCP			Suspension buvable	Peut être écrasé et administré avec de l'eau. A prendre pendant les repas.		4/18/2023
RUXOLITINIB 5, 10, 15 et 20 mg (Jakavi)	Comprimé	L01EJ01	Autres antinéoplasiques	Inhibiteurs de protéine kinase			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
SACCHAROMYCES BOULARDII 50 et 200 mg (Ultra-levure)	Géule	A07FA02	Micro-organismes anti diarrhéiques	Micro-organismes anti diarrhéiques			Réponse laboratoire			Poudre pour suspension buvable	Ne pas ouvrir les géules dans l'environnement d'un patient immunodéprimé ou porteur d'un cathéter veineux (risque de contamination).	Biocodex 17-02-2022 : ouvrable si administration immédiate, sauf cas particuliers (cf. RCP). Ne pas dissoudre dans un liquide réfrigéré. Sensible à l'humidité.	4/18/2023
SACCHAROMYCES CEREVISIAE / CHARBON ACTIVE (Carbolevure adultes)	Géule	A07BA51	Absorbants intestinaux	Préparations à base de charbon activé			Notice patient			Non	A prendre de préférence en dehors des repas.	Pierre Fabre 21-02-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude.	4/18/2023
SAXAGLIPTINE / METFORMINE 2,5/1000 mg (Komboglyze)	Comprimé	A10BD10	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Association de médicaments oraux réduisant la glycémie			Notice patient			Non	A prendre pendant les repas.	AstraZeneca 06-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût métallique.	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou déléité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
SAXAGLIPTINE 5 mg (Onglyza)	Comprimé	A10BH03	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)			RCP			Non	A prendre de préférence à heure fixe.	AstraZeneca 06-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
SELEGILINE 5 mg (Deprenyl)	Comprimé sécable	N04BD01	Dopaminergiques	Inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B (MAO-B)			Thériaque 03/2023			Dispositif transdermique (AAC)	A prendre pendant les repas.		4/18/2023
SERTRALINE 25 et 50 mg (Zoloft)	Gélule	N06AB06	Antidépresseurs	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (SRS)			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas.	Pfizer 04-08-2020 : ouverture déconseillé car hors-AMM. Pas d'étude.	4/18/2023
SEVELAMER 800 mg (Renvela)	Comprimé	V03AE02	Tous autres médicaments	Médicaments de l'hyperkaliémie et l'hyperphosphorémie			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Poudre pour suspension buvable	A prendre pendant les repas.		9/19/2023
SILDENAFIL 20, 25, 50 et 100 mg (Revatio, Viagra)	Comprimé	G04BE03	Autres médicaments urologiques, antispasmodiques inclus	Médicaments utilisés dans les troubles de l'érection			Thériaque 03/2023	Revatio : écrasable selon HUG 03/2023		Poudre pour suspension buvable, comprimés orodispersibles	A prendre environ 1h avant l'activité. Eviter le jus de pamplemousse. La poudre pour suspension buvable est destinée à traitée l'HTAP		4/18/2023
SILODOSINE 4 et 8mg (Urorec, Silodex)	Gélule	G04CA04	Médicaments urologiques	Alpha-bloquants			RCP	Urorec : ouvrable selon HUG 03/2023		Non	A prendre pendant les repas, de préférence à heure fixe.	En attente (Bouchara-Recordati) 05/2024	5/22/2024
SIMVASTATINE 20 et 40 mg (Zocor)	Comprimé ou comprimé sécable	C10AA01	Agents réduisant les lipides sériques, non associés	Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)			Réponse laboratoire			Non	A prendre le soir. Eviter le jus de pamplemousse.	MSD 19-09-2020 : écrasement possible si administration immédiate. Le pelliculage masque le goût amer.	4/18/2023
SIROLIMUS 0,5 ; 1 et 2 mg (Rapamune)	Comprimé	L04AA10	Immunosuppresseurs	Immunosuppresseurs sélectifs			RCP			Solution buvable Δ Adaptation posologique Δ	A prendre pendant ou hors des repas, mais de façon constante. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
SITAGLIPTINE 50 et 100 mg (Januvia, Xelvia)	Comprimé	A10BH01	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)		?		Januvia : écrasable selon HUG 03/2023		Non		En attente (MSD)	4/18/2023
SOFOSBUVIR 400 mg (Sovaldil)	Comprimé	J05AP08	Antiviraux à action directe	Autres antiviraux			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre pendant les repas. Mauvais goût.	Gilead 02-03-2022 : écrasement et fractionnement déconseillés car pas d'étude et goût très amer si broyé.	4/18/2023
SOLIFENACINE 5 et 10 mg (Vesicare)	Comprimé	G04BD08	Autres médicaments urologiques, antispasmodiques inclus	Antispasmodiques urinaires			RCP			Suspension buvable			4/18/2023
SOTALOL 80 et 160 mg (Sotalex)	Comprimé sécable	C07AA07	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants non sélectifs			Réponse laboratoire	Ecrasable selon laboratoire		Non	A prendre de préférence le matin.	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement possible, produit soluble dans l'eau.	4/18/2023
SPIRAMYCINE 3 MUI (Rovamycine)	Comprimé	J01FA02	Macrolides, lincosamides et streptogramines	Macrolides			RCP			Non	A prendre pendant les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
SPIRONOLACTONE 25, 50 et 75 mg (Aldactone)	Comprimé sécable	C03DA01	Diurétiques épargneurs potassiques	Antagonistes de l'aldostérone			RCP			Non	Peut être écrasé et mis en suspension, de préférence dans un liquide sucré.	Pfizer 04-08-2020 : cf. RCP. Très peu hydrosoluble. Goût amer.	4/18/2023
SUCRALFATE 1 g (Keal)	Comprimé sécable	A02BX02	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien	Anticholinergiques synthétiques, esters d'amines tertiaires			Notice patient			Suspension buvable	Peut être écrasé dans un peu d'eau.		4/18/2023
SULBUTIAMINE 200 mg (Aralion)	Comprimé	A11DA02	Vitamine B1 associée ou non avec les vitamines B6 et/ou B12	Vitamine B1, non associée			RCP			Non	A prendre pendant les repas le matin et le midi.	Servier 28-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
SULFADIAZINE 500 mg (Adiazine)	Comprimé	J01EC02	Sulfamides et triméthoprime	Sulfamides de demi-vie intermédiaire			RCP			Non	Peut être écrasé et mélangé à un aliment (jus de fruit, yaourt, purée...). Goût amer.		4/18/2023
SULFAMETHOXAZOLE / TRIMÉTHOPRIME 400/80 et 800/160 mg (Cotrimoxazole, Bactrim, Bactrim Forte)	Comprimé	J01EE01	Sulfamides et triméthoprime	Associations de sulfamidés et de triméthoprime, y compris des dérivés			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Suspension buvable	A prendre de préférence pendant les repas.	Eumedica 02-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
SULFASALAZINE 500 mg (Salazopyrine)	Comprimé GR	A07EC01	Anti-inflammatoires intestinaux	Acide aminosalicilyque et dérivés			RCP			Non	A prendre de préférence après les repas.	Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
SULFATE FERREUX / ACIDE ASCORBIQUE 50/30 mg (Timoferol)	Comprimé	B03AA07	Préparations martiales	Préparations orales de fer bivalent		?				Solution buvable de sulfate ferreux seul (Tardyferon)	A prendre de préférence le matin avant les repas, ou pendant selon la tolérance digestive. Eviter le thé.	En attente (Elerte)	9/19/2023
SULFATE FERREUX / ACIDE ASCORBIQUE 50/30 mg (Timoferol)	Gélule	B03AA07	Préparations martiales	Préparations orales de fer bivalent			Thériaque 03/2023			Solution buvable de sulfate ferreux seul (Tardyferon)	A prendre de préférence le matin avant les repas, ou pendant selon la tolérance digestive. Eviter le thé.		4/18/2023
SULFATE FERREUX / ACIDE FOLIQUE 50 mg / 350 µg (Tardyferon B9)	Comprimé	B03AD03	Préparations martiales	Fer associé à l'acide folique			RCP			Solution buvable de sulfate ferreux seul (Tardyferon)	A prendre de préférence avant les repas, ou pendant selon la tolérance digestive. Eviter le thé.		4/18/2023
SULFATE FERREUX 50 et 80 mg (Tardyferon)	Comprimé	B03AA07	Préparations martiales	Préparations orales de fer bivalent			RCP			Solution buvable	A prendre de préférence avant les repas, ou pendant selon la tolérance digestive. Eviter le thé.		4/18/2023
SULINDAC 100 et 200 mg (Arthrocline)	Comprimé ou comprimé sécable	M01AB02	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Dérivés de l'acide acétique et apparentés			RCP			Non	A prendre pendant les repas.		4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
SULPIRIDE 200 mg (Dogmatil)	Comprimé sécable	N05AL01	Antipsychotiques	Benzamides			Réponse laboratoire			Solution buvable		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
SULPIRIDE 50 mg (Dogmatil)	Gélule	N05AL01	Antipsychotiques	Benzamides			Réponse laboratoire			Solution buvable		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
SUMATRIPTAN 50 mg (Imigrane)	Comprimé	N02CC01	Antimigraineux	Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Solution pour pulvérisation nasale	Peut être dissout sans l'écraser dans un peu d'eau. A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible. Goût amer.		4/18/2023
TACROLIMUS 0,5 ; 1, 2 et 5 mg (Adoport, Prograf)	Gélule	L04AD02	Immunosuppresseurs	Inhibiteurs de la calcineurine			RCP			Granulés pour suspension buvable	Si nécessaire le contenu de la gélule peut être dispersé dans de l'eau et administré par sonde naso-gastrique (Δ PA cytotoxique ; protection du manipulateur requise). A prendre à jeun ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. Eviter le jus de pamplemousse.		4/23/2024
TACROLIMUS LP 0,5 ; 0,75 ; 1, 2, 3, 4 et 5 mg (Advagraf, Conferoport)	Gélule LP	L04AD02	Immunosuppresseurs	Inhibiteurs de la calcineurine			RCP			Δ Non LP Δ Granulés pour suspension buvable	PA cytotoxique. A prendre à jeun ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. Eviter le jus de pamplemousse.		9/19/2023
TADALAFIL 2,5 ; 5, 10 et 20 mg (Adcirca, Cialis)	Comprimé	G04BE08	Autres médicaments urologiques, antispasmodiques inclus	Médicaments utilisés dans les troubles de l'érection			Notice patient			Non	A prendre ≥ 30 min avant l'activité. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
TAMOXIFENE 10 et 20 mg (Nolvadex)	Comprimé ou comprimé sécable	L02BA01	Antihormones et apparentés	Anti-oestrogènes			Réponse laboratoire			Non	PA cytotoxique.	AstraZeneca 02-10-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Photosensible.	4/18/2023
TAMSULOSINE LP 0,4 (Omexel LP, Mecir LP)	Comprimé LP	G04CA02	Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate	Alpha-bloquants			RCP			Non	A prendre à heure fixe.	Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
TAMSULOSINE LP 0,4 (Omix LP)	Gélule LP	G04CA02	Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate	Alpha-bloquants			RCP			Non	A prendre à heure fixe après un repas consistant, de préférence le matin.	Astellas Pharma 14-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
TELMISARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 40/12,5 ; 80/12,5 et 80/25 mg (Pitorplus)	Comprimé	C09DA07	Antagonistes de l'angiotensine II en associations	Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques			Réponse laboratoire			Non	A prendre à heure fixe.	Bayer 21-02-2022 : écrasement déconseillé car photosensible.	4/18/2023
TELMISARTAN 20, 40 et 80 mg (Micardis, Pritor)	Comprimé	C09CA07	Antagonistes de l'angiotensine II non associés	Antagonistes de l'angiotensine II non associés			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe.	Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Sensible à l'humidité et à l'oxydation.	4/18/2023
TEMOZOLOMIDE 5, 20, 100, 140, 180 et 250 mg (Temodal)	Gélule	L01AX03	Alkylants	Autres alkylants			RCP			Non	PA cytotoxique. A prendre à jeun et à distance des repas, de préférence à heure fixe.		4/18/2023
TENOFOVIR 123, 163, 204 et 245 mg (Viread)	Comprimé	J05AF07	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique			RCP			Granulés	A prendre pendant les repas. Peut être écrasé ou délité dans ≥ 100 mL d'eau, de jus d'orange ou de raisin pour administration immédiate.		4/18/2023
TENOXCAM 20 mg (Tilcotil)	Comprimé sécable	M01AC02	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens	Oxicams			RCP			Non	A prendre pendant les repas.	Viatris 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
TERBINAFINE 250 mg (Lamisil)	Comprimé sécable	D01BA02	Antifongiques à usage systémique	Antifongiques à usage systémique			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe, de préférence pendant les repas.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
TERTATOLOL 5 mg (Artex)	Comprimé sécable	C07AA16	Bêta-bloquants	Bêta-bloquants non sélectifs			Réponse laboratoire			Non	A prendre le matin.	Servier 28-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
THALIDOMIDE 50 mg (génériques)	Gélule	L04AX02	Immunosuppresseurs	Autres immunosuppresseurs			RCP			Non	PA cytotoxique et tératogène. A prendre de préférence le soir.	Bristol Myers Squibb 28-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
THEOPHYLLINE LP 50, 100, 200 et 300 mg (Dilatrane LP)	Gélule LP	R03DA04	Autres médicaments systémiques pour les syndromes obstructifs des voies respiratoires	Xanthines			RCP			Sirop			4/18/2023
THIAMINE 250 mg (Benerva)	Comprimé	A11DA01	Vitamine B1 associée ou non avec les vitamines B6 et/ou B12	Vitamine B1, non associée			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non			9/19/2023
THIAMAZOL 5, 10, 20 mg (Thyrozol)	Comprimé	H03BB02	Préparations antithyroïdienne	Dérivé de l'imidazole contenant du soufre			Réponse laboratoire			Non		Merck 07-05-2025 : écrasement possible, pas d'étude de stabilité, à boire immédiatement	5/12/2025
THIOLCHICOSIDE 4 mg (génériques)	Comprimé	M03BX05	Myorelaxants à action centrale	Autres myorelaxants à action centrale			Réponse laboratoire			Non		Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
THIOLCHICOSIDE 4 mg (Miorel)	Gélule	M03BX05	Myorelaxants à action centrale	Autres myorelaxants à action centrale			Réponse laboratoire			Non		DB Pharma 21-02-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
THIOGUANINE 40 mg (Lanvis)	Comprimé sécable	L01BB03	Antimétabolites	Analogues de la purine			Réponse laboratoire			Non	PA cytotoxique.	ASPEN Pharma 22-02-2022 : des protocoles existent pour réaliser des solutions à partir des comprimés, en suivant les précautions d'usage de manipulation des produits cytotoxiques.	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
TIANEPTINE 12,5 mg (<i>Stablon</i>)	Comprimé	N06AX14	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			Réponse laboratoire			Non	A prendre au début des repas.	Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
TIAPRIDE 100 mg (<i>Tiapridal</i>)	Comprimé sécable	N05AL03	Antipsychotiques	Benzamides			Réponse laboratoire	<i>Ecrasable selon HUG 03/2023</i>		Solution buvable		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
TICAGRELOR 90 mg (<i>Brilique</i>)	Comprimé	B01AC24	Antithrombotiques	Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire sauf héparines			RCP			Comprimés orodispersibles	Peut être écrasé et mélangé à ½ verre d'eau et bu immédiatement. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
TICLOPIDINE 250 mg (<i>Ticlid</i>)	Comprimé	B01AC05	Antithrombotiques	Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire sauf héparines			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence pendant les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
TIPRANAVIR 250 mg (<i>Aptivus</i>)	Capsule molle	J05AE09	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de protéase			RCP			Non	A prendre pendant les repas.	Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : cf. RCP	4/18/2023
TOLVAPTAN 15, 30, 60, 90 et 120 mg (<i>Jinarc</i>)	Comprimé	C03XA01	Autres diurétiques	Antagonistes de la vasopressine			RCP			Non	La 1ère dose (la plus forte) est à prendre le matin ≥ 30 min avant les repas. La 2ème dose peut être prise pendant ou en dehors des repas. Eviter le jus de pamplemousse.		4/18/2023
TOPIRAMATE 15, 25 et 50 mg (<i>Epitomax</i>)	Gélule	N03AX11	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			RCP			Non	Peut être ouvert et réparti sur une cuillère à café de nourriture semi-solide de n'importe quel type. Administration immédiate. Goût amer.		4/18/2023
TOPIRAMATE 25, 50, 100 et 200 mg (<i>Epitomax</i>)	Comprimé	N03AX11	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			RCP			Gélules ouvrables	Goût amer.		4/18/2023
TRAMADOL 50 mg (<i>Contramal, Topalgic</i>)	Gélule	N02AX02	Opioides	Autres opioides			Réponse laboratoire			Comprimés effervescents, comprimés orodispersibles, solution buvable		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	4/18/2023
TRAMADOL 50 mg (<i>Topalgic</i>)	Comprimé	N02AX02	Opioides	Autres opioides			Réponse laboratoire			Comprimés effervescents, comprimés orodispersibles, solution buvable		Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	9/19/2023
TRAMADOL LP 50, 100, 150 et 200 mg (<i>Zamudol LP</i>)	Gélule LP	N02AX02	Opioides	Autres opioides			RCP			Pas d'équivalent LP	Peut être ouvert dans une cuillère. A avaler à l'aide d'un verre d'eau.		4/18/2023
TRAMADOL LP 50, 100, 150, 200 et 300 mg (<i>Contramal LP, Monoalgic LP, Topalgic LP</i>)	Comprimé LP	N02AX02	Opioides	Autres opioides			RCP			Gélules LP ouvrables			4/18/2023
TRANDOLAPRIL / VERAPAMIL LP 180/2, 240/2 et 240/4 mg (<i>Tarka LP</i>)	Comprimé LP	C09B10	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et inhibiteurs des canaux calciques			Galénique			Non	A prendre le matin de préférence à heure fixe, environ 30 min avant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Viatris 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
TRANDOLAPRIL 0,5 ; 2 et 4 mg (<i>Orlik</i>)	Gélule	C09AA10	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association			Réponse laboratoire			Non	Les gélules seront avalées avec une quantité suffisante de liquide (1/2 à 1 verre d'eau).	Viatris 17-02-2023 : Les gélules peuvent être ouvertes.	4/18/2023
TRIAMTERENE / HYDROCHLOROTHIAZIDE 50/25 mg (<i>Prestole</i>)	Gélule	C03EA01	Diurétiques et épargneurs potassiques en association	Diurétiques low-ceiling et épargneurs potassiques		?				Non	A prendre le matin.	En attente (Almirall)	4/18/2023
TRICLABENDAZOLE 250 mg (<i>Egaten</i>)	Comprimé sécable	P02BX04	Antitrématodes	Autres antitrématodes			Notice patient			Non	A prendre de préférence pendant ou après un repas. Peut être écrasé et mélangé à de la nourriture semi-solide.	Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
TRIHEXYPHENIDYLE 2 et 5 mg (<i>Artane</i>)	Comprimé	N04AA01	Anticholinergiques	Amines tertiaires			Réponse laboratoire			Solution buvable		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	9/19/2023
TRIHEXYPHENIDYLE LP 2 et 5 mg (<i>Parkinane LP</i>)	Gélule LP	N04AA01	Anticholinergiques	Amines tertiaires			Thériaque 03/2023			Δ Non LP Δ Solution buvable			4/18/2023
TRIMEBUTINE 100 et 200 mg (<i>Debridat</i>)	Comprimé	A03AA05	Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux	Anticholinergiques synthétiques, esters d'amines tertiaires			Réponse laboratoire					Pfizer 14-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	9/19/2023
TRIMETAZIDINE 20 mg (<i>Vastarel</i>)	Comprimé	C01EB15	Autres médicaments pour le cœur	Autres médicaments pour le cœur			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas.	Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
TRIMETAZIDINE LM 35 mg (<i>Vastarel LM</i>)	Comprimé LM	C01EB15	Autres médicaments pour le cœur	Autres médicaments pour le cœur			Galénique			Non	A prendre pendant les repas.	Servier 28-02-2022 : non écrasable car forme à libération modifiée	4/18/2023
TRIMPRAMINE 25 et 100 mg (<i>Surmontil</i>)	Comprimé ou comprimé sécable	N06AA06	Antidépresseurs	Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines			Réponse laboratoire	<i>Ecrasable selon HUG 03/2023</i>		Solution buvable	A prendre de préférence le soir.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
TROPATEPINE 10 mg (<i>Lepticur</i>)	Comprimé	N04AA12	Anticholinergiques	Amines tertiaires			Réponse laboratoire			Non		Laboratoires Dalbert 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude, mais possible en cas de nécessité uniquement.	4/18/2023
TROSPIDIUM 20 mg (<i>Ceris</i>)	Comprimé	G04BD09	Autres médicaments urologiques, antispasmodiques inclus	Antispasmodiques urinaires			RCP			Non	A prendre à jeun avant un repas.		4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de maj
URAPIDIL LP 30 et 60 mg (Eupressyl LP)	Gélule LP	C02CA06	Antiangrénergiques agissant en périphérie	Alpha-bloquants			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas matin et soir.	Cherapharm 14-03-2022 : Il est peu probable que l'ouverture de la gélule ait des effets indésirables. Il est cependant essentiel de veiller à ne pas endommager les microgranules qui assurent la LP.	9/19/2023
VALACICLOVIR 500 mg (Zelitrex)	Comprimé	J05AB11	Antiviraux à action directe	Nucléosides et nucléotides sauf inhibiteurs de la transcriptase inverse			Notice patient			Non		GSK 02-10-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
VALGANCICLOVIR 450 mg (Rovacyte)	Comprimé	J05AB14	Antiviraux à action directe	Nucléosides et nucléotides sauf inhibiteurs de la transcriptase inverse			RCP	Ecrasable selon HUG 03/2023		Poudre pour suspension buvable	PA cytotoxique. A prendre pendant les repas.		4/18/2023
VALPROATE 200, 250 et 500 mg (Depakine)	Comprimé GR	N03AG01	Antiépileptiques	Dérivés d'acides gras			Notice patient			Solution buvable, sirop			4/18/2023
VALPROATE LP 100, 250, 500, 750 et 1000 mg (Micropakine LP)	Granulés LP	N03AG01	Antiépileptiques	Dérivés d'acides gras			RCP			Δ Non LP Δ Solution buvable, sirop	A saupoudrer sur un aliment mou ou une boisson, froid ou à température ambiante (yaourt, jus d'orange, compote...). Administration immédiate. A prendre de préférence au cours des repas.		4/18/2023
VALPROATE LP 500 mg (Depakine chrono)	Comprimé LP	N03AG01	Antiépileptiques	Dérivés d'acides gras			RCP			Granulés LP	A prendre de préférence au cours des repas.		4/18/2023
VALPROMIDE 300 mg (Depamide)	Comprimé GR	N03AG02	Thymorégulateur	Dérivés d'acides gras			Notice patient			Non		Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 80/12,5 ; 160/12,5 et 160/25 mg (Cotareg)	Comprimé	C09DA03	Antagonistes de l'angiotensine II en associations	Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques		?				Non	A prendre à heure fixe, de préférence le matin.	En attente (Biogaran)	4/18/2023
VALSARTAN 40, 80 et 160 mg (Tareg)	Comprimé ou comprimé sécable	C09CA03	Antagonistes de l'angiotensine II non associés	Antagonistes de l'angiotensine II non associés		?				Solution buvable	A prendre à heure fixe.	En attente (Biogaran)	4/18/2023
VENETOCLAX 10, 50 et 100 mg (Venclyxto)	Comprimé	L01XX52	Autres antineoplasiques	Autres antineoplasiques			RCP			Non	A prendre à heure fixe pendant les repas.	Abbvie 26-06-2025 ; les comprimés ne doivent pas être croqués, écrasés ou cassés avant d'être avalés.	6/26/2025
VENLAFAXINE 50 mg (génériques)	Comprimé	N06AX16	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			Thériaque 03/2023	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non		Viatris 28-03-2024 : écrasement déconseillé car pas d'étude	3/28/2024
VENLAFAXINE LP 150 et 225 mg (génériques)	Comprimé LP	N06AX16	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			RCP			Non	A prendre de préférence pendant les repas.		4/18/2023
VENLAFAXINE LP 37,5 ; 75 et 150 mg (Effexor LP)	Gélule LP	N06AX16	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			RCP	Ouvrable selon laboratoire		Comprimés LP	A prendre à heure fixe pendant les repas.	Pfizer 04-08-2020 : la gélule n'est qu'un excipient. Une étude interne montre la possibilité de mélanger les microgranules à une compote, à avaler immédiatement.	4/18/2023
VERAPAMIL 120 mg (Isoptine)	Gélule	C08DA01	Inhibiteurs calciques cardioselectifs	Dérivés de la phénylalkylamine			RCP			Non	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Viatris 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
VERAPAMIL 40 et 120 mg (Isoptine)	Comprimé	C08DA01	Inhibiteurs calciques cardioselectifs	Dérivés de la phénylalkylamine			Réponse laboratoire			Non	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Viatris 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
VERAPAMIL LP 240 mg (génériques)	Gélule LP	C08DA01	Inhibiteurs calciques cardioselectifs	Dérivés de la phénylalkylamine			Réponse laboratoire			Non	A prendre de préférence pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Teva 01-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude. Sensible à l'humidité.	4/18/2023
VERAPAMIL LP 240 mg (Isoptine LP)	Comprimé sécable LP	C08DA01	Inhibiteurs calciques cardioselectifs	Dérivés de la phénylalkylamine			RCP			Non	A prendre de préférence pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Viatris 17-02-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	4/18/2023
VIGABATRINE 500 mg (Sabril)	Comprimé sécable	N03AG04	Antiépileptiques	Dérivés d'acides gras			Réponse laboratoire			Granulés pour solution buvable	A prendre avant ou après les repas.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
VILDAGLIPTINE 50 mg (Galvus)	Comprimé	A10BH02	Hypoglycémiantes autres que les insulines	Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)			RCP			Non		Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	4/18/2023
VINORELBINE 20 et 30 mg (Navelbine)	Capsule molle	L01CA04	Alcaloïdes végétaux et autres produits d'origine naturelle	Vinca-alcaloïdes et analogues			RCP			Non	PA cytotoxique. A prendre de préférence en fin d'un repas léger ou d'une collation. Ne pas prendre avec une boisson gazeuse.	Pierre Fabre 21-02-2022 : PA irritant	4/18/2023
VORASIDENIB 10 et 40mg (génériques)	Comprimé	L01XM04	Autres antineoplasiques	Inhibiteurs de l'isocitrate déshydrogénase (IDH)			Réponse laboratoire			Non	A prendre à heure fixe, 2h avant un repas ou 1h après.	Servier 03-06-2025 ; pas de données pour écraser/diluer dans l'eau ni pour l'administration par sonde nasogastrique	6/4/2025
VORICONAZOLE 50 et 200 mg (Vfend)	Comprimé	J02AC03	Antimycosiques à usage systémique	Dérivés triazolés			Notice patient			Suspension buvable	A prendre ≥ 1h avant ou après un repas.		4/18/2023
VORTIOXETINE 5, 10, 15 et 20mg (Brintellix)	Comprimé	N06AX26	Antidépresseurs	Autres antidépresseurs			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023			A prendre avec ou sans aliments.	Lundbeck 06-12-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude	12/6/2023
WARFARINE 2 et 5 mg (Coumadine)	Comprimé sécable	B01AA03	Antithrombotiques	Antivitamines K			Réponse laboratoire			Suspension buvable (AAC)	A prendre à heure fixe, de préférence le soir.	BMS 19-08-2020 : 2 études mentionnent la stabilité de la Coumadine écrasée en suspension.	4/18/2023

Principe actif	Forme galénique	Classe ATC	Libellé ATC3	Libellé ATC4	Goût	Modalités de préparation	Source des modalités	Autre source	Méthode d'administration si médicament écrasé, ouvert ou délité	Alternatives galéniques	Informations RCP, notice patient et Thériaque	Réponses laboratoires résumées	Date de mise à jour
ZIDOVUDINE 100 et 250 mg (<i>Retrovir</i>)	Gélule	J05AF01	Antiviraux à action directe	Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique			Notice patient	Ouvrable selon HUG 03/2023		Solution buvable		GSK 20-03-2023 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ZINC GLUCONATE 15 mg (<i>Effizinc, Rubozinc</i>)	Gélule	D10BX	Anti-acnéiques à usage systémique	Autres anti-acnéiques à usage systémique		?				Non	A prendre à distance des repas, si possible ≥ 2h, en position assise avec un grand verre d'eau. Ne pas s'allonger jusqu'à 30 min après la prise.	En attente (Labactal)	4/18/2023
ZOLMITRIPTAN 2,5 mg (<i>Zomig</i>)	Comprimé	N02CC03	Antimigraineux	Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1			Thériaque 03/2023			Comprimés orodispersibles	A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible.		4/18/2023
ZOLPIDEM 10 mg (<i>Stilnox</i>)	Comprimé sécable	N05CF02	Hypnotiques et sédatifs	Apparentés aux benzodiazépines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Comprimé sublingual	A prendre avant le coucher.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ZONISAMIDE 25, 50 et 100mg (<i>Zonegran</i>)	Gélule	N03AX15	Antiépileptiques	Autres antiépileptiques			RCP	Ouvrable selon HUG 03/2023		Non	A prendre à heure fixe, pendant ou en dehors des repas.	Advanz Pharma 26-06-2024 : Selon une étude (Shah et al. (2001a, 2001b)), pas de différence significative dans les paramètres pharmacocinétiques entre les gélules intactes et les gélules ouvertes.	6/26/2024
ZOPICLONE 3,75 et 7,5 mg (<i>Imovane</i>)	Comprimé sécable	N05CF01	Hypnotiques et sédatifs	Apparentés aux benzodiazépines			Réponse laboratoire	Ecrasable selon HUG 03/2023		Non	A prendre avant le coucher.	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	4/18/2023
ZUCLOPENTHIXOL 10 et 25 mg (<i>Clopixol</i>)	Comprimé	N05AF05	Antipsychotiques	Dérivés du thioxanthène			Réponse laboratoire			Solution buvable en gouttes		Lundbeck 14-03-2022 : Pas d'étude de stabilité mais écrasement et dissolution possible dans l'eau si administration immédiate. Goût amer.	4/18/2023