

CONTACTS

Fanny MARHUENDA, Chef de Projet, Observatoire dédié au Cancer B PL,
ICO Paul Papin – ANGERS
02 41 35 27 00 (poste 2483) - fanny.marhuenda@ico.unicancer.fr

Delphine DENIEL-LAGADEC, Chef de Projet, Observatoire dédié au Cancer B PL,
CHU Brest Morvan - BREST
02 98 22 39 80 - delphine.deniel-lagadec@chu-brest.fr

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter !



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Bourgeois H, Jestin le Tallec V, De Decker L et al. « ANALYSE SECONDAIRE DE LA VALIDATION CLINIQUE DU SCORE PRONOSTIQUE PRONOPALL CHEZ UNE POPULATION ONCOGÉRIATRIQUE SUIVIE POUR UN CANCER EN SITUATION PALLIATIVE ». Innov Ther Oncol 2019 ; doi : 10.1684/ito.2019.0178
- Bourgeois H, Grudé F, Solal-Céligny P *et al.* «CLINICAL VALIDATION OF A PROGNOSTIC TOOL IN A POPULATION OF OUTPATIENTS TREATED FOR INCURABLE CANCER UNDERGOING ANTICANCER THERAPY: PRONOPALL STUDY”. Ann Oncol. 2017; 28 (7) : 1612–1617
- Barbot AC, Mussault P, Ingrand P *et al.* “ASSESSING 2-MONTH CLINICAL PROGNOSIS IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH ADVANCED SOLID TUMORS”. J Clin Oncol, 26 : 2538-2543, 2008

OMEDIT Bretagne

OMEDIT Pays de la Loire



**Outil d'aide à la décision
sur la stratégie thérapeutique
en phase avancée d'un cancer :**


LE SCORE PRONOPALL

Brochure d'information pour les professionnels de santé



LES PHASES PALLIATIVES

Phases palliatives les traitements du patient



A QUOI SERT LE SCORE PRONOPALL ?

- Faciliter la communication précoce entre l'équipe oncologique et équipe identifiée « soins palliatifs »
- Etre un support de communication avec les patients et les proches pour aborder les soins palliatifs
- Introduire précocement les soins palliatifs
- Eviter les ruptures d'équipe dans un moment difficile pour le patient et sa famille
- Pouvoir proposer une pause dans les traitements spécifiques

QUAND FAIRE LE SCORE PRONOPALL ?

- Patient < ou ≥ 75 ans
- 7 cancers uniquement :
 - ⇒ sein, poumon, colorectal, pancréas, ovaire, prostate ou rein
 - ⇒ localement avancé ou métastatique
- Critères complémentaires au choix :
 - ⇒ Etat général du patient altéré (PS ECOG ≥ 2)
 - ⇒ Réfractaire au dernier traitement anticancéreux
 - ⇒ Espérance de vie estimée < à 6 mois

CALCUL DU SCORE PRONOPALL ?

PS ECOG	0-1 score = 0	2-3 score = 2	4 score = 4	=.../4
Nombre de sites métastatiques	≤1 score = 0	≥2 score = 2		=.../2
LDH* (UI/L)	< 1.5N** score = 0	≥ 1.5N** score = 1		=.../1
Albumine* (g/L)	≥ 33 score = 0	< 33 score = 3		=.../3
SCORE				=.../10

*Dosage sanguin récent

** Valeur Normale Supérieure

MÉDIANES DE SURVIE EN FONCTION DU SCORE :

	Défavorable	Intermédiaire	Favorable
Score	8 à 10	4 à 7	0 à 3
Survie médiane (délai score-décès)	35 jours IC95 [14-56]	78 jours IC95 [71-114]	301 jours IC95 [209-348]
	Renforcer les Soins Palliatifs si besoin Proposition d'arrêt/pause de la chimiothérapie	Réévaluer les besoins en Soins Palliatifs Intérêts des traitements spécifiques?	Orienter le patient vers l'équipe de Soins de support et/ou Soins Palliatifs

Les items du score peuvent varier en fonction de l'état et de la maladie de votre patient, il est souhaitable de suivre l'évolution du score pour adapter au mieux sa prise en charge.